

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG
BÀI CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG

1. Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại ?
 - a. Quận thể
 - b. Quận xã
 - c. Cơ thể
 - d. Hệ sinh thái
2. Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của hệ sống là :
 - a. Sinh quyền
 - b. Hệ sinh thái
 - c. Loài
 - d. Hệ cơ quan
3. Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành :
 - a. Hệ cơ quan
 - b. Mô
 - c. Cơ thể
 - d. Cơ quan
4. Tổ chức sống nào sau đây là bào quan ?
 - a. Tim
 - b. Phổi
 - c. Ribôxôm
 - d. Não bộ
5. Tổ chức nào sau đây là đơn vị phân loại của sinh vật trong tự nhiên ?
 - a. Quận thể
 - b. Loài
 - c. Quận xã
 - d. Sinh quyền
6. Hoạt động nào sau đây xảy ra ở tế bào sống ?
 - a. Trao đổi chất
 - b. Sinh trưởng và phát triển
 - c. Cảm ứng và sinh trưởng
 - d. Tất cả các hoạt động nói trên
7. Điều nào dưới đây là sai khi nói về tế bào ?
 - a. Là đơn vị cấu tạo cơ bản của sự sống
 - b. Là đơn vị chức năng của tế bào sống
 - c. Được cấu tạo từ các mô
 - d. Được cấu tạo từ các phân tử, đại phân tử vào bào quan
8. Tập hợp các cơ quan, bộ phận của cơ thể cùng thực hiện một chức năng được gọi là:
 - a. Hệ cơ quan
 - b. Đại phân tử
 - c. Bào quan
 - d. Mô
9. Đặc điểm chung của prôtêtin và axit nuclêic là :
 - a. Đại phân tử có cấu trúc đa phân
 - b. Là thành phần cấu tạo của màng tế bào
 - c. Đều được cấu tạo từ các đơn phân axít amin
 - d. Đều được cấu tạo từ các nucléit
10. Phân tử ADN và phân tử ARN có tên gọi chung là :
 - a. Prôtêtin
 - b. Pôlisaccirit
 - c. A xít nuclêic
 - d. Nuclêotit
11. Hệ thống các nhóm mô được sắp xếp để thực hiện một loại chức năng thành lập nên và nhiều tạo thành hệ

Tùy đúng để điền vào chỗ trống của câu trên là:

 - a. Tế bào
 - b. Cơ thể
 - c. Cơ quan
 - d. Bào quan
12. Đặc điểm chung của trùng roi, a mip, vi khuẩn là:
 - a. Đều thuộc giới động vật

- b. Đều có cấu tạo đơn bào

c. Đều thuộc giới thực vật

d. Đều là những cơ thể đa bào

13. Tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một vùng địa lý nhất định ở một thời điểm xác định và có quan hệ sinh sản với nhau được gọi là :

a. Quần thể

b. Nhóm quần thể

c. Quận xã

d. Hệ sinh thái

14. Một hệ thống tương đối hoàn chỉnh bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của nó được gọi là :

a. Quận thể

b. Hệ sinh thái

c. Loài sinh vật

d. Nhóm quần xã

15. Hãy chọn câu sau đây có thứ tự sắp xếp các cấp độ tổ chức sống từ thấp đến cao:

a. Cơ thể, quần thể, hệ sinh thái, quận xã

b. Quận xã, quần thể, hệ sinh thái, cơ thể

c. Quận thể, quận xã, cơ thể, hệ sinh thái

d. Cơ thể, quần thể, quận xã, hệ sinh thái .

16. Ở sinh vật, đơn vị quần xã dùng để chỉ tập hợp của :

a. Toàn bộ các sinh vật cùng loài

b. Toàn bộ các sinh vật khác loài

c. Các quần thể sinh vật khác loài trong 1 khu vực sống

d. Các quần thể sinh vật cùng loài .

17. Tập hợp các sinh vật và hệ sinh thái trên trái đất được gọi là :

a. Thuỷ Quyển

b. Sinh quyển

c. Khí quyển

d. Thạch quyển

18. Điều dưới đây đúng khi nói về một hệ thống sống :

a. Một hệ thống mở

b. Có khả năng tự điều chỉnh

c. Thường xuyên trao đổi chất với môi trường

d. Cả a,b,c, đều đúng

BÀI GIỚI THIỆU CÁC GIỚI SINH VẬT

1. Nhà phân loại học Caclinê đã phân chia sinh vật làm hai giới :
 - a. Giới khởi sinh và giới nguyên sinh
 - b. Giới động vật và giới thực vật**
 - c. Giới nguyên sinh và giới động vật
 - d. Giới thực vật và giới khởi sinh
 2. Vị khuẩn là dạng sinh vật được xếp vào giới nào sau đây ?
 - a. Giới nguyên sinh
 - b. Giới thực vật
 - c. Giới khởi sinh**
 - d. Giới động vật
 3. Đặc điểm của sinh vật thuộc giới khởi sinh là :
 - a. Chưa có cấu tạo tế bào
 - b. Tế bào cơ thể có nhân sơ**
 - c. Là những có thể có cấu tạo đa bào
 - d. Cả a,b,c đều đúng

4. Sinh vật thuộc giới nào sau đây có đặc điểm cấu tạo nhân tế bào khác hẳn với các giới còn lại ?

- a. Giới nấm
- b. Giới động vật
- c. Giới thực vật
- d. Giới khởi sinh

5. Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới Nguyên sinh , giới thực vật và giới động vật là :

- a. Cơ thể đều có cấu tạo đa bào
- b. Tế bào cơ thể đều có nhân sơ
- c. Cơ thể đều có cấu tạo đơn bào
- d. **Tế bào cơ thể đều có nhân chuẩn .**

6. Điểm giống nhau của các sinh vật thuộc giới nấm và giới thực vật là:

- a. Đều có lối sống tự dưỡng
- b. Đều sống cố định
- c. **Đều có lối sống hoại sinh**
- d. Cơ thể có cấu tạo đơn bào hay đa bào

7. Sinh vật nào sau đây có cấu tạo cơ thể đơn bào và có nhân chuẩn ?

- a. **Động vật nguyên sinh**
- b. Vi khuẩn
- c. Virut
- d. Cả a, b , c đều đúng

8. Những giới sinh vật có đặc điểm cấu tạo cơ thể đa bào và có nhân chuẩn là:

- a. **Thực vật, nấm, động vật**
- b. Nguyên sinh , khởi sinh , động vật
- c. Thực vật , nguyên sinh , khởi sinh
- d. Nấm, khởi sinh, thực vật

9. Hiện nay người ta ước lượng số loài sinh vật đang có trên Trái đất vào khoảng:

- a. **1,5 triệu**
- b. 2,5 triệu
- c. 3,5 triệu
- d. 4,5 triệu

10. Trong các đơn vị phân loại sinh vật dưới đây, đơn vị thấp nhất so với các đơn vị còn lại là:

- a. Họ
- b. Bộ
- c. Lớp
- d. **Loài**

11. Bậc phân loại cao nhất trong các đơn vị phân loại sinh vật là :

- a. Loài
- b. Ngành
- c. Giới
- d. Chi

12. Đặc điểm của động vật khác biệt so với thực vật là:

- a. Có cấu tạo cơ thể đa bào
- b. **Có phương thức sống dị dưỡng**
- c. Được cấu tạo từ các tế bào có nhân chuẩn
- d. Cả a, b, c đều đúng

13. Phát biểu nào sau đây đúng với nấm ?

- a. Là những sinh vật đa bào
- b. Cấu tạo tế bào có chứa nhân chuẩn
- c. Sống dị dưỡng theo lối hoại sinh
- d. **Cả a, b, c đều đúng**

14. Câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là :

- a. Chỉ có thực vật mới sống tự dưỡng quang hợp

BÀI: GIỚI KHỎI SINH, GIỚI NGUYÊN SINH VÀ GIỚI NÂM

1. Điều sau đây đúng khi nói về đặc điểm của vi khuẩn là:
 - a. Có tốc độ sinh sản rất nhanh
 - b. Tế bào có nhân chuẩn
 - c. Cơ thể chưa có cấu tạo tế bào
 - d. Cơ thể đa bào
 2. Môi trường sống của vi khuẩn là :
 - a. Đất và nước
 - b. Có thể sống được trong điều kiện môi trường khắc nghiệt
 - c. Có thể có nhân chuẩn
 - d. Cả a, b , c đều đúng
 3. Sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp tự dưỡng ?
 - a. Vi khuẩn hình que
 - b. Vi khuẩn hình cầu
 - c. Vi khuẩn lam
 - d . Vi khuẩn hình xoắn
 4. Đặc điểm nào sau đây không phải của tảo ?
 - a. Cơ thể đơn bào hay đa bào ?
 - b. Có chứa sắc tố quang hợp
 - c. Sống ở môi trường khô cạn
 - d. Có lối sống tự dưỡng
 5. Điểm giống nhau giữa nấm nhài với động vật nguyên sinh là:
 - a. Có chứa sắc tố quang hợp
 - b. Sống dị dưỡng
 - c. Có cấu tạo đa bào
 - d. Tế bào cơ thể có nhiều nhân
 6. Đặc điểm nào sau đây là chung cho tảo, nấm nhài và động vật nguyên sinh ?
 - a.Có nhân chuẩn
 - b. Sống dị dưỡng theo lối hoại sinh
 - c. Có khả năng quang hợp
 - d. Cả a,b, và c đều đúng
 7. Sinh vật có cơ thể tồn tại ở hai pha : pha đơn bào và pha hợp bào (hay cộng bào) là:
 - a. Vi khuẩn
 - b. Nấm nhài
 - c.Tảo
 - d. Động vật nguyên sinh
 8. Đặc điểm có ở giới nguyên sinh là :
 - a Cơ thể đơn bào

Sử dụng đoạn câu dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 20 đến 25 :

Động vật nguyên sinh thuộc giới(I) là những sinh vật..... (II), sống(III).

Tảo thuộc giới.....(IV) là những sinh vật.....(V), sống.....(VI)

20. Só(I) là :

- a. Nguyên sinh
c. Khởi sinh
b. Động vật
d. Thực vật

21. Số(II) là :
a. Đa bào bậc cấp
c. Đơn bào
b. Đa bào bậc cao
d. Đơn bào và đa bào

22. Số (III) là :
a.Tự dưỡng
c. Kí sinh bắt buộc
b.Dị dưỡng
d.Cộng sinh

23. Số (IV) là :
a. Thực vật
c.Nấm
b. Nguyên sinh
d.Khởi sinh

24. Số (VI) là :
a. Tự dưỡng theo lối hoá tổng hợp
b.Tự dưỡng theo lối quang tổng hợp
c. Dị dưỡng theo lối hoại sinh
d.Kí sinh bắt buộc

BÀI GIỚI THUẾ VẬT

1. Đặc điểm cấu tạo có ở giới thực vật mà không có ở giới nấm là :
 - a. Tế bào có thành xenlulôzơ và chức nhiều lục lạp
 - b. Cơ thể đa bào
 - c. Tế bào có nhân chuẩn
 - d. Tế bào có thành phần là chất kitin
 2. Đặc điểm nào dưới đây không phải là của giới thực vật
 - a. Sống cố định
 - b. Tự dưỡng theo lối quang tổng hợp
 - c. Cảm ứng chậm trước tác dụng môi trường
 - d. Có lối sống di thường

Sử dụng đoạn câu sau đây để trả lời các câu hỏi số 3,4,5:

Nhờ có chúa..... (I) nên thực vật có khả năng tự tổng hợp..... (II) từ chất vô cơ thông qua hấp thụ..... (III)

3. Số (I) là :

 - a. Chất xenlulzơ
 - b. Kitin
 - c. **Chất diệp lục**
 - d. Cutin

4. Số (II) là :

 - a. **Chất hữu cơ**
 - b. Prôtêin
 - c. Thành xenlulôzơ
 - d. Các bào quan

5. Số (III) là :

 - a. Nước
 - b. **Năng lượng mặt trời**
 - c. Khí oxi
 - d. Khí cacbônic

6. Sắp xếp nào sau đây đúng theo thứ tự tiến hóa từ thấp đến cao của các n

 - a. Quyết, rêu, hạt tràn, hạt kín
 - b. Hạt tràn , hạt kín , rêu , quyết
 - c.Rêu, hạt kín, quyết, hạt tràn

- d. Râu, quyết , hạt trần hạt kín**
7. Nguồn gốc phát sinh các ngành thực vật là :
- Nấm đa bào
 - Tảo lục nguyên thuỷ đơn bào
 - Động vật nguyên sinh
 - Vi sinh vật cỏ
8. Đặc điểm của thực vật ngành rêu là :
- Đã có rễ, thân lá phân hoá
 - Chưa có mạch dẫn**
 - Có hệ mạch dẫn phát triển
 - Có lá thật và lá phát triển
9. Điểm giống nhau giữa thực vật ngành rêu với ngành quyết là :
- Sinh sản bằng bào tử
 - Đã có hạt
 - Thụ tinh không cần nước
 - Cả a,b, và c đều đúng
10. Hạt được bảo vệ trong quả là đặc điểm của thực vật thuộc ngành
- Rêu
 - c. Hạt trần
 - Quyết
 - Hạt kín**
11. Thực vật thuộc ngành nào sau đây sinh sản bằng hạt ?
- Hạt trần
 - Rêu
 - Quyết
 - Hạt trần và hạt kín**
12. Đặc điểm nào sau đây đúng với thực vật ngành Hạt trần ?
- Gồm có 2 lớp : Lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm
 - Chưa có hệ mạch dẫn
 - Cây thân gỗ, có hệ mạch phát triển**
 - Thân gỗ nhưng không phân nhánh
13. Hoạt động nào sau đây chỉ có ở thực vật mà không có ở động vật?
- Hấp thụ khí ô xy trong quá trình hô hấp
 - Tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ**
 - Thải khói CO₂ qua hoạt động hô hấp
 - Cả 3 hoạt động trên
14. Hệ thống rễ của thực vật giữ vai trò nào sau đây ?
- Hấp thụ năng lượng mặt trời để quang hợp
 - Tổng hợp chất hữu cơ
 - Cung cấp khí ô xy cho khí quyển
 - Giữ đất, giữ nước, hạn chế xói mòn đất**
15. Điểm đặc trưng của thực vật phân biệt với động vật là :
- Có nhân chuẩn
 - Cơ thể đa bào phức tạp
 - Sống tu dưỡng**
 - Có các mô phân hoá
16. Ngành thực vật chiếm ưu thế hiện nay trên trái đất là :
- Rêu
 - Quyết
 - Hạt trần**
 - Hạt kín**
17. Ngành thực vật có phương thức sinh sản hoàn thiện nhất
- Hạt kín**
 - Hạt trần
 - Quyết
 - Rêu
18. Thực vật nào sau đây thuộc ngành hạt trần?
- Cây lúa
 - Cây thông**

- b. Cây dương sỉ d. Cây bắp

19. Thực vật nào sau đây thuộc ngành hạt kín ?

a. Cây thiên tuế c. Cây dương sỉ

b. Cây rêu d. **Cây sen**

20. Hai ngành thực vật có mối quan hệ nguồn gốc gần nhất là :

a. Rêu và hạt trần c. **Hạt trần và hạt kín**

b. Hạt kín và rêu d. Quyết và Hạt kín

BÀI GIỚI ĐỘNG VẬT

1. Đặc điểm nào sau đây không phải của giới động vật ?
 - a. Cơ thể đa bào phức tạp
 - b. Tế bào có nhân chuẩn
 - c. Có khả năng di chuyển tích cực trong môi trường
 - d. **Phản ứng chậm trước môi trường**
 2. Đặc điểm nào sau đây ở động vật mà không có ở thực vật ?
 - a. Tế bào có chứa chất xenlucôzơ
 - b. **Không tự tổng hợp được chất hữu cơ**
 - c. Có các mô phát triển
 - d. Có khả năng cảm ứng trước môi trường
 3. Đặc điểm nào sau đây được dùng để phân biệt giữa động vật với thực vật .
 - a. Khả năng tự di chuyển
 - b. Tế bào có thành bằng chất xen lu cô zơ
 - c. Khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ .
 - d. **Cả a,b,c đều đúng**
 4. Động vật kiêu dinh dưỡng hoặc lối sống nào sau đây ?
 - a. Tự dưỡng
 - b. Luôn hoại sinh
 - c. **Dị dưỡng**
 - d. Luôn ký sinh
 5. Đặc điểm cấu tạo nào sau đây là của động vật ?
 - a. Có cơ quan dinh dưỡng
 - b. Có cơ quan sinh sản
 - c. Có cơ quan gắn chặt cơ thể vào môi trường sống
 - d. **Có cơ quan thần kinh**
 6. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về giới động vật ?
 - a. Phát sinh sớm nhất trên trái đất
 - b. Cơ thể đa bào có nhân sơ
 - c. **Gồm những sinh vật dị dưỡng**
 - d. Chỉ phân bố ở môi trường cạn
 7. Giới động vật phát sinh từ dạng sinh vật nào sau đây ?
 - a. **Trùng roi nguyên thuỷ**
 - b. Tảo đa bào
 - c. Vi khuẩn
 - d. Nấm
 8. Trong các ngành động vật sau đây, ngành nào có mức độ tiến hóa thấp nhất so với các ngành còn lại ?
 - a. Ruột khoang
 - b. Giun tròn
 - c. Thân mềm
 - d. Chân khớp

9. Sinh vật dưới đây thuộc ngành ruột khoang là :
- a. Bò cạp
 - b. Châu chấu
 - c. Sứa biển
 - d. Tôm sông
10. Trong giới động vật, ngành có mức độ tiến hoá nhất là:
- a. Thân mềm
 - b. **Có xương sống**
 - c. Chân khớp
 - d. Giun dẹp
11. Sinh vật dưới đây thuộc ngành giun đốt là:
- a. Giun đũa
 - b. Đĩa phiến
 - c. **Giun đất**
 - d. Giun kim
12. Con cháu chấu được xếp vào ngành động vật nào sau đây?
- a. Ruột khoang
 - b. Da gai
 - c. Thân mềm
 - d. **Chân khớp**
13. Phát biểu nào sau đây đúng với động vật ngành thân mềm
- a. Là ngành động vật tiến hoá nhất
 - b. Chỉ phân bố ở môi trường nước
 - c. **Cơ thể không phân đốt**
 - d. Cơ thể luôn có vỏ kitin bao bọc
14. Động vật thuộc ngành nào sau đây có cơ thể đối xứng toả tròn?
- a. Chân khớp
 - b. Dây sống
 - c. **Ruột khoang**
 - d. Giun dẹp
15. Lớp động vật dưới đây không được xếp vào ngành động vật có xương sống là :
- a. Lưỡng cư
 - b. **Sâu bọ**
 - c. Bò sát
 - d. Thú
16. Động vật dưới đây có cơ thể không đối xứng hai bên là :
- a. **Hải quỳ**
 - b. Éch đồng
 - c. Bò cạp
 - d. Cua biển
17. Cấu trúc nào sau đây được xem là đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt giữa động vật có xương sống với động vật thuộc các ngành không có xương sống ?
- a. Vỏ kitin của cơ thể
 - b. Hệ thần kinh
 - c. Vỏ đá vô
 - d. **Cột sống**
18. Động vật có vai trò nào sau đây ?
- a . Tự tổng hợp chất hữu cơ cung cấp cho hệ sinh thái
 - b. Làm tăng lượng ô xy của không khí
 - c. **Cung cấp thực phẩm cho con người**
 - d. Cả a, b , và c đều đúng
19. Phát biểu nào sau đây sau khi nói về vai trò của động vật ?
- a. Góp phần tạo ra sự cân bằng sinh thái
 - b. Nhiều loài cung cấp thực phẩm cho con người
 - c. Nhiều loài có thể là tác nhân truyền bệnh cho con người
 - d. Khi tăng số lượng đều gây hại cho cây trồng

PHẦN II: SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG 1: THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO BÀI CÁC CHẤT VÔ CƠ

1. Có khoảng bao nhiêu nguyên tố hóa học cần thiết cấu thành các cơ thể sống ?

a. 25 b.35 c.45 d.55
2. Nhóm các nguyên tố nào sau đây là nhóm nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống ?

a. C,Na,Mg,N c.H,Na,P,Cl
 b.C,H,O,N d.C,H,Mg,Na
3. Tỷ lệ của nguyên tố các bon (C) có trong cơ thể người là khoảng

a. 65% b.9,5% **c.18,5%** d.1,5%
4. Trong các nguyên tố hóa học sau đây, nguyên tố nào chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ thể người ?

a. Cacbon c. Nitơ
 b.Hidrô **d. Ô xi**
5. Các nguyên tố hóa học chiếm lượng lớn trong khối lượng khô của cơ thể được gọi là :

a. Các hợp chất vô cơ
 b. Các hợp chất hữu cơ
 c. Các nguyên tố đại lượng
 d. Các nguyên tố vi lượng
6. Nguyên tố nào dưới đây là nguyên tố đại lượng ?

a. Mangan c.Kẽm
 b.Đồng **d.Photpho**
7. Nguyên tố nào sau đây không phải là nguyên tố vi lượng ?

a. Canxi c. Lưu huỳnh
 b. Sắt d. Photpho
8. Nguyên tố hóa học đặc biệt quan trọng tham gia cấu tạo nên các đại phân tử hữu cơ là :

a. **Cacbon** c. Hidrô
 b.Ô xi d. Nitơ
9. Các nguyên tố tham gia cấu tạo các chất hữu cơ đầu tiên trên trái đất là:

a. C,H,O,N c.Ca,Na,C,N
 b.C,K,Na,P d .Cu,P,H,N
10. Những chất sống đầu tiên của trái đất nguyên thuỷ tập trung ở môi trường nào sau đây?

a. Không khí **c. Biển**
 b. Trong đất d. Không khí và đất
11. Trong các cơ thể sống , tỷ lệ khối lượng của các nguyên tố C, H,O,N chiếm vào khoảng

a. 65% b.70% c.85% **d.96%**
- 12.Nguyên tố Fe là thành phần của cấu trúc nào sau đây ?

a. Hê môglôbin trong hồng cầu của động vật
 b. Diệp lục tố trong lá cây
 c. Sắc tố mêtanol trong lớp da
 d. Sắc tố của hoa , quả ở thực vật
13. Cấu trúc nào sau đây có thành phần bắt buộc là các nguyên tố vi lượng?

a. Lớp biểu bì của da động vật
 b. Enzim
 c. Các dịch tiêu hoá thức ăn
 d. Cả a, b, c đều sai

14. Trong các cơ thể sống, thành phần chủ yếu là :
a. Chất hữu cơ
b. Chất vô cơ
c. Nước
d. Vitamin

15. Trong tế bào, nước phân bố chủ yếu ở thành phần nào sau đây ?
a. Màng tế bào
b. Chất nguyên sinh
c. Nhân tế bào
d. Nhiễm sắc thể

16. Nước có vai trò sau đây ?
a. Dung môi hoà tan của nhiều chất
b. Thành phần cấu tạo bắt buộc của tế bào
c. Là môi trường xảy ra các phản ứng sinh hóa của cơ thể
d. **Cả 3 vai trò nêu trên**

17. Để cho nước biến thành hơi, phải cần năng lượng:
a. Để bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa các phân tử
b. Để bẻ gãy các liên kết cộng hóa trị của các phân tử nước.
c. Thấp hơn nhiệt dung riêng của nước
d. Cao hơn nhiệt dung riêng của nước.

18. Nước có đặc tính nào sau đây ?
a. Dung môi hoà tan của nhiều chất
b. Thành phần cấu tạo bắt buộc của tế bào
c. Là môi trường xảy ra các phản ứng sinh hóa của cơ thể
d. **Cả 3 vai trò nêu trên**

19. Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, có hiện tượng nước bốc hơi khỏi cơ thể. Điều này có ý nghĩa :
a. Làm tăng các phản ứng sinh hóa trong tế bào
b. **Tạo ra sự cân bằng nhiệt cho tế bào và cơ thể**
c. Giảm bớt sự tỏa nhiệt từ cơ thể ra môi trường
d. Tăng sự sinh nhiệt cho cơ thể

BÀI CÁC CHẤT HỮU CƠ TRONG TẾ BÀO CACBONHIDRAT (SACACRIT) VÀ LIPIT

1. Cacbonhiđrat là tên gọi dùng để chỉ nhóm chất nào sau đây?
a. Đường c. Đạm
b. Mỡ d. Chất hữu cơ
 2. Các nguyên tố hoá học cấu tạo của Cacbonhiđrat là :
a. Các bon và hidrô b. Hidrô và ôxi
c. Ôxi và các bon d. Các bon, hidrô và ôxi
 3. Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm các thuật ngữ còn lại ?
a. Đường đơn c. Đường đa
b. Đường đôi d. Cacbonhidrat
 4. Đường đơn còn được gọi là :
a. Mônôsaccarit c. Pentôzơ
b. Frutôzơ d. Mantôzơ
 5. Đường Fructôzơ là :
a. Glicôzơ c. Pentôzơ

- b.Fructôzơ d. Mantzơ

6. Đường Fructôzơ là :
a. Một loại a xít béo c. Một disaccarit
b. Đường Hê xôzơ d. Một loại Pôlisaccarit

7.Hợp chất nào sau đây có đơn vị cấu trúc là Glucôzơ
a. Mantôzơ c. Lipit đơn giản
b.Phốtpholipit d. Pentôzơ

8.Chất sau đây thuộc loại đường Pentôzơ
a. Ribôzơ và fructôzơ b.Glucôzơ và đêôxiribôzơ
c.Ribô zơ và đêôxiribôzơ d.Fructôzơ và Glucôzơ

9. Đường sau đây không thuộc loại hexôzơ là :
a.Glucôzơ c. Galactôzơ
b.Fructôzơ d. **Tinh bột**

10. Chất nào dưới đây thuộc loại đường Pôlisaccarit
a. Mantôzơ c.Điaccarit
b. Tinh bột d.Hêxôzơ

12. Sắp xếp nào sau đây đúng theo thứ tự các chất đường từ đơn giản đến phức tạp ?
a.Đisaccarit, mònôsaccarit, Pôlisaccarit
b. Mônôsaccarit, Điaccarit, Pôlisaccarit
c.Pôlisaccarit, mònôsaccarit, Đisaccarit
d.Mònôsaccarit, Pôlisaccarit, Điaccarit

13. Loại đường nào sau đây không cùng nhóm với những chất còn lại?
a.Pentôzơ c.**Mantôzơ**
b.Glucôzơ d.Fructôzơ

14.Fructôzơ thuộc loại :
a. Đường mía c. Đường phức
b. Đường sữa d. **Đường trái cây**

15. Đường mía do hai phân tử đường nào sau đây kết hợp lại ?
a. Glucôzơ và Fructôzơ b. Xenlucôzơ và galactôzơ
c. Galactôzơ và tinh bột d. Tinh bột và mantôzơ

16. Khi phân giải phân tử đường factôzơ , có thể thu được kết quả nào sau đây?
a. Hai phân tử đường glucôzơ
b. Một phân tử glucôzơ và 1 phân tử galactôzơ
c. Hai phân tử đường Pentôzơ
d. Hai phân tử đường galactôzơ

17. Chất sau đây được xếp vào nhóm đường pôlisaccarit là :
a. Tinh bột c.Glicôgen
b.Xenlucôzơ d. **Cả 3 chất trên**

18. Chất dưới đây không được cấu tạo từ Glucôzơ là :
a.Glicôgen c.Fructôzơ
b.Tinh bột d.Mantôzơ

Bỏ câu 19,20

21. Hai phân tử đường đơn liên kết nhau tạo phân tử đường đôi bằng loại liên kết nào sau đây ?
a. Liên kết peptit c. **Liên kết glicôzit**

- b. Liên kết hoá trị d. Liên kết hiđrô

22. Nhóm chất nào sau đây là những chất đường có chứa 6 nguyên tử các bon ?
a. Glucôzơ , Fructôzơ , Pentôzơ
b.Fructôzơ , galactôzơ, glucôzơ
c.Galactôzơ, Xenlucôzơ, Tinh bột
d.Tinh bột , lactôzơ, Pentôzơ

23. Phát biểu nào sau đây có nội dung đúng ?
a. Glucôzơ thuộc loại pôlisaccarit
b.Glicôgen là đường môngsaccarit
c. Đường môngsaccarit có cấu trúc phức tạp hơn đường disaccarit
d. Galactôzơ, còn được gọi là đường sữa

24. Trong cấu tạo tế bào , đường xenlulôzơ có tập trung ở :
a. Chất nguyên sinh c. Nhân tế bào
b. Thành tế bào d. Mang nhân

25. Chức năng chủ yếu của đường glucôzơ là :
a. Tham gia cấu tạo thành tế bào
b. Cung cấp năng lượng cho hoạt động tế bào
c. Tham gia cấu tạo nhiễm sắc thể
d. Là thành phần của phân tử ADN

26. Lipit là chất có đặc tính
a. Tan rất ít trong nước
c. Không tan trong nước
b. Tan nhiều trong nước
d. Có ái lực rất mạnh với nước

27. Chất nào sau đây hòa tan được lipit?
a. Nước
b. Rượu
c. Benzen
d. Cả 2 chất nêu trên

28. Thành phần cấu tạo của lipit là :
a. A xít béo và rượu
b. Gliêrol và đường
c. Đường và rượu
d. Axit béo và Gliêrol

29. Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên lipit là :
a. Cacbon, hidrô, ôxi
c. Ôxi,Nito,hidrô,
b. Nito , hidrô, Cacbon
d. Hidrô, ôxi, phốt pho

30 . Phát biểu sau đây có nội dung đúng là :
a. Trong mỡ chứa nhiều axít no
b. Phân tử dầu có chứa 1glixêrol
c. Trong mỡ có chứa 1glixêrol và 2 axit béo
d. Dầu hòa tan không giới hạn trong nước .

31. Photpholipit có chức năng chủ yếu là :
a. Tham gia cấu tạo nhân của tế bào .
b. Là thành phần cấu tạo của màng tế bào
c. Là thành phần của máu ở động vật
d. Cấu tạo nên chất diệp lục ở lá cây

32. Nhóm chất nào sau đây là những lipit phức tạp ?
a. Triglixêric, axit béo , glixêrol
c.Stêroit và photpholipit
b. Mỡ , photpholipit
d. Cả a,b,c đều đúng

33. Chất dưới đây tham gia cấu tạo hoocmôn là :

- a.Stêroit
b.Phôtpholipit
c.Triglixêric
d. Mỡ

34. Loại liên kết hoá học giữa axit béo và glixêrol trong phân tử Triglixêric

a. Liên kết hidrô
b. **Liên kết este**
c. Liên kết peptit
d. Liên kết hoá trị

35. Chất dưới đây không phải lipit là :

a. Côlestêron
b. Sáp
c. Hoocmon ostrôgen
d. **Xenlulôzo**

36. Chất nào sau đây tan được trong nước?

a. Vitamin A
b. Phôtpholipit
c. **Vitamin C**
d. Stêrôit

BÀI CÁC CHẤT HỮU CƠ TRONG TẾ BÀO Prôtéin

- b. 4,3,2,1 d. 4,2,3,1

11- Tính đa dạng của prôtêin được qui định bởi

 - Nhóm amin của các axit amin
 - Nhóm R của các axit amin
 - Liên kết peptit
 - Thành phần , số lượng và trật tự axitamin trong phân tử prôtêin**

12. Cấu trúc của phân tử prôtêtin có thể bị biến tính bởi :

 - Liên kết phân cực của các phân tử nước
 - Nhiệt độ**
 - Sự có mặt của khí oxi
 - Sự có mặt của khí CO₂

13. Bậc cấu trúc nào của prôtêtin ít bị ảnh hưởng nhất khi các liên kết hidrô trong prôtêin bị phá vỡ ?

 - Bậc 1**
 - Bậc 2
 - c. Bậc 3
 - d. Bậc 4

Bỏ câu 14, 15

16. Đặc điểm của phân tử prôtêin bậc 1 là :

 - Chuỗi polipeptit ở dạng không xoắn cuộn**
 - Chuỗi polipeptit ở dạng xoắn đặc trưng
 - Chuỗi polipeptit ở dạng cuộn tạo dạng hình cầu
 - Cả a,b,c đều đúng

17 Chuỗi polipeptit xoắn lò xo hay gấp nếp lại là cấu trúc prôtêin:

 - Bậc 1
 - Bậc 2**
 - c. Bậc 3
 - d. Bậc 4

18. Điểm giống nhau của prôtêin bậc 1, prôtêin bậc 2 và prôtêin bậc 3 là :

 - Chuỗi polipeptit ở dạng mạch thẳng
 - Chuỗi polipeptit xoắn lò xo hay gấp lại
 - Chỉ có cấu trúc 1 chuỗi polipeptit**
 - Chuỗi polipeptit xoắn cuộn tạo dạng khối cầu

19. Đặc điểm của prôtêin bậc 4, cũng là điểm phân biệt với prôtêin ở các bậc còn lại là

 - Cấu tạo bởi một chuỗi polipeptit
 - Cấu tạo bởi một chuỗi polipeptit xoắn cuộn hình cầu**
 - Có hai hay nhiều chuỗi polipeptit
 - Chuỗi polipeptit xoắn dạng lò xo

20. Prôtêin không có đặc điểm nào sau đây ?

 - Dễ biến tính khi nhiệt độ tăng cao
 - Có tính đa dạng
 - Là đại phân tử có cấu trúc đa phân
 - Có khả năng tự sao chép**

21. Loại prôtêin nào sau đây không có chứa liên kết hiđrô?

 - Prôtêin bậc 1**
 - Prôtêin bậc 2
 - c. Prôtêin bậc 3
 - d. Prôtêin bậc 4

22. Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin?

 - Cấu trúc bậc 1**
 - Cấu trúc bậc 2
 - c. Cấu trúc bậc 3
 - d. Cấu trúc bậc 4

23. Prôtêin thực hiện được chức năng của nó chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây

- a. Cấu trúc bậc 1 và bậc 4
- b. Cấu trúc bậc 1 và bậc 2
- c. Cấu trúc bậc 2 và bậc 3
- d. Cấu trúc bậc 3 và bậc 4**

24. Cấu trúc không gian bậc 2 của Prôtêin được duy trì và ổn định nhờ:

- a. Các liên kết hiđrô**
- b. Các liên kết photpho dieste
- c. Các liên kết cùng hoá trị
- d. Các liên kết peptit

Bỏ câu 25, 26, 27

28. Loại Prôtêin sau đây có chức năng điều hoà các quá trình trao đổi chất trong tế bào và cơ thể là:

- a. Prôtêin cấu trúc
- b. Prôtêin kháng thể
- c. Prôtêin vận động
- d. Prôtêin hoomôn**

29. Prôtêin tham gia trong thành phần của enzym có chức năng :

- a. Xúc tác các phản ứng trao đổi chất**
- b. Điều hoà các hoạt động trao đổi chất
- c. Xây dựng các mô và cơ quan của cơ thể
- d. Cung cấp năng lượng cho hoạt động tế bào .

30. Cấu trúc nào sau đây có chứa Prôtêin thực hiện chức năng vận chuyển các chất trong cơ thể ?

- a. Nghiên sắc thể
- c. Xương
- b. Hêmôglôbin**
- d. Cơ

BÀI CÁC CHẤT HỮU CƠ TRONG TẾ BÀO axit nuclêic

1. Chất nào sau đây được cấu tạo từ các nguyên tố hóa học C,H,O,N,P?

- a. Prôtêin
- c. photpholipit
- b. axit nuclêic**
- d. Axit béo

2. Axit nuclêic bao gồm những chất nào sau đây ?

- a. ADN và ARN**
- c. ARN và Prôtêin
- b. Prôtêin và ADN
- d. ADN và lipit

3. Đặc điểm chung của ADN và ARN là :

- a. Đều có cấu trúc một mạch
- b. Đều có cấu trúc hai mạch
- c. Đều được cấu tạo từ các đơn phân axit amin
- d. Đều có những phân tử và có cấu tạo đa phân**

4. Đơn phân cấu tạo của phân tử ADN là :

- a. Axit amin
- c. Nuclêotit
- b. Plinuclêotit
- d. Ribônuclêotit

5. Các thành phần cấu tạo của mỗi Nuclêotit là :

- a. Đường , axit và Prôtêin
- b. Đường , bazơ nitơ và axit**
- c. Axit,Prôtêin và lipit
- d. Lipit, đường và Prôtêin

6. Axit có trong cấu trúc đơn phân của ADN là :

- a. Axit photphoric**
- c. Axit clohidric

- b. A xit sunfuric d. A xit Nitoric
7. Đường tham gia cấu tạo phân tử ADN là :
 a. Glucôzơ
 b. Xenlulôzơ
 c. **Đêôxiribôzơ**
 d. Saccarôzơ
8. ADN được cấu tạo từ bao nhiêu loại đơn phân ?
 a. 3 loại
 b. **4 loại**
 c. 5 loại
 d. 6 loại
9. Các loại Nuclêotit trong phân tử ADN là :
 a. Adenin, uraxin, timin và guanin
 b. Uraxin, timin, Adenin, xi tòzin và guanin
 c. **Guanin,xi tòzin ,timin và Adenin**
 d. Uraxin,timin,xi tòzin và Adenin
10. Đặc điểm cấu tạo của phân tử ADN là :
 a. Có một mạch pôlinuclêôtít
 b. **Có hai mạch pôlinuclêôtít**
 c. Có ba mạch pôlinuclêôtít
 d. Có một hay nhiều mạch pôlinuclêôtít
11. Giữa các Nuclêotit kế tiếp nhau trong cùng một mạch của ADN xuất hiện liên kết hoá học nối giữa :
 a. Đường và axít
 b. axít và bazơ
 c. Bazơ và đường
 d. Đường và đường
12. Các đơn phân của phân tử ADN phân biệt với nhau bởi thành phần nào sau đây?
 a. Số nhóm -OH trong phân tử đường
 b. **Bazơ nitơ**
 c. Gốc photphat trong axit photphoric
 d. Cả 3 thành phần nêu trên
13. Giữa các nuclêôtít trên 2 mạch của phân tử ADN có :
 a. G liên kết với X bằng 2 liên kết hiđrô
 b. A liên kết với T bằng 3 liên kết hiđrô
 c. **Các liên kết hidrô theo nguyên tắc bỏ sung**
 d. Cả a,b,c đều đúng
14. Chức năng của ADN là :
 a. Cung cấp năng lượng cho hoạt động tế bào
 b. **Bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền**
 c. Trực tiếp tổng hợp Prôtêin
 d. Là thành phần cấu tạo của màng tế bào
15. Trong phân tử ADN, liên kết hiđrô có tác dụng
 a. Liên kết giữa đường với axit trên mỗi mạch
 b. Nối giữa đường và bazơ trên 2 mạch lại với nhau
 c. Tạo tính đặc thù cho phân tử ADN
 d. **Liên kết 2 mạch Polinuclêôtít lại với nhau**
- bỏ câu 16,17,18
19. Đặc điểm cấu tạo của ARN khác với ADN là :
 a. Đại phân tử, có cấu trúc đa phân
 b. Có liên kết hiđrô giữa các nuclêôtít

- a. ARN thông tin b. ARN ribôxôm
c. ARN vận chuyển d. Tất cả các loại ARN
31. Điểm giống nhau giữa các loại ARN trong tế bào là:
a. Đều có cấu trúc một mạch
b. Đều có vai trò trong quá trình tổng hợp prôtêin
c. Đều được tạo từ khuôn mẫu trên phân tử ADN
d. Cả a,b và c đều đúng
32. Kí hiệu của các loại ARN thông tin , ARN vận chuyển , ARN ribôxôm lần lượt là :
a. tARN,rARN và mARN b. mARN,tARN và rARN
c. rARN, tARN và mARN d. mARN,rARN và tARN
33. Câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là :
a. Trong các ARN không có chứa ba zơ nitơ loại timin
b. Các loại ARN đều có chứa 4 loại đơn phan A,T,G,X
c. ARN vận chuyển là thành phần cấu tạo của ribôxôm
d. tARN là kí hiệu của phân tử ARN thông tin
34. Câu có nội dung sai trong các câu sau đây là :
a. ADN và ARN đều alf các đại phân tử
b. Trong tế bào có 2 loại axist nuclêic là ADN và ARN
c. Kích thước phân tử của ARN lớn hơn ADN
d. Đơn phân của ADN và ARN đều gồm có đường , axit, ba zơ ni to
- Bỏ 35,36,37
38. Loại ARN không phải thành phần cấu tạo của ribôxôm là :
a. ARN thông tin và ARN ribôxôm
b. ARN ribôxôm và ARN vận chuyển
c. ARN vận chuyển và ARN thông tin
d. Tất cả các loại ARN
39. Các phân tử ARN đều được tổng hợp từ (I) và sau đó thực hiện chức năng ở (II) số (I) và số (II) lần lượt là :
a. Nhân , nhân
b. Nhân , tế bào chất
c. Tế bào chất , Tế bào chất
d. Tế bào chất , nhân
40. Điều không đúng khi nói về phân tử ARN là :
a. Có cấu tạo từ các đơn phân ribônuclêôtit
b. Thực hiện các chức năng trong tế bào chất
c. Đều có vai trò trong tổng hợp prôtêin
d. Gồm 2 mạch xoắn

BÀI: VAI TRÒ CỦA CÁC LIÊN KẾT HÓA HỌC

1. Liên kết hoá học là một lực hút giữa với nhau trong phân tử hay trong tinh thể.
Phân điền đúng vào chỗ trống của câu trên là :
a. Hai nguyên tử c. Hai chất
b. Hai phân tử d. Nhiều phân tử

2..... là liên kết được hình thành giữa một nguyên tử hiđrô mang điện tích dương và một nguyên tử mang điện tích âm. Phần điền đúng vào chỗ trống của câu trên là :

- a. Liên kết hoá học
 - b. **Liên kết hiđrô**
 - c. Liên kết ion
 - d. Liên kết photpho dieste
3. Đặc điểm của liên kết hiđrô là :
- a. Rất bền vững
 - b. **Bền vững**
 - c. **Yếu**
 - d. Vừa bền , vừa yếu
4. Cấu trúc nào sau đây có chứa liên kết hiđrô ?
- a. Phân tử ADN
 - b. Phân tử mARN
 - c. Phân tử prôtêin
 - d. Cả a và c đều đúng**

5. Thời gian tồn tại của mỗi liên kết hiđrô là bao lâu ?

- a. 104 giây
- c. 104 giây
- b. 104 giây
- d. 104 giây

6. Điều nào sau đây đúng khi nói về liên kết hiđrô ?

- a. Có thời gian tồn tại lâu trong cơ thể sống
- b. Được hình thành với số lượng lớn trong tế bào**
- c. Khó bị phá vỡ dưới tác dụng của men
- d. Rất bền vững đối với sự thay đổi của nhiệt độ

Bỏ 7

8 Đặc điểm của liên kết Van de Waals là :

- a. Rất bền vững
- c. Yếu**
- b. Bền vững
- d. Hai ý a, b đúng

9. Câu có nội dung đúng sau đây là :

- a. Liên kết hiđrô yêu hơn liên kết Van de Waals
- b. Liên kết hiđrô và liên kết Van de Waals đều bền vững
- c. Liên kết Van de Waals đều bền
- d. Liên kết Van de Waals yêu hơn liên kết hiđrô**

10. Loại liên kết hóa học xuất hiện giữa hai nguyên tử khi chúng nằm quá gần nhau được gọi là:

- a. Liên kết Van de Waals**
- b. Liên kết hiđrô
- c. Liên kết cộng hóa trị
- d. Liên kết este

11. Trong dung dịch , loại liên kết nào sau đây vẫn nhiều năng lượng để bẻ gãy ?

- a. Liên kết cộng hóa trị**
- b. Liên kết kị nước
- c. Liên kết hiđrô
- d. Liên kết Van de Waals

12. Xếp theo thứ tự độ bền tăng dần của các liên kết hóa học

- a. Liên kết hiđrô , Liên kết Van de Waals , Liên kết cộng hóa trị
- b. Liên kết cộng hóa trị , Liên kết Van de Waals , Liên kết hiđrô
- c. Liên kết Van de Waals , Liên kết hiđrô , Liên kết cộng hóa trị**
- d. Liên kết hiđrô , Liên kết cộng hóa trị , Liên kết Van de Waals

13. Loại liên kết nào sau đây cần bẻ gãy nó cần ít năng lượng nhất ?

- a. Liên kết hi đrô
- b. Liên kết Van de Waals**
- c. Liên kết cộng hoá trị
- d. Liên kết peptit

14. Loại liên kết hóa học xuất hiện do tương tác tĩnh điện giữa hai nhóm có điện tích trái dấu được gọi tắt là :

- a. Liên kết photphodiester
- b. Liên kết hi đrô
- c. Liên kết ion**
- d. Liên kết Van de Waals

15. Điểm giống nhau giữa liên kết hi đrô , liên kết kị nước và Liên kết Van de Waals là :

- a. Muốn bẻ gãy cần phải nhiều năng lượng
- b. Có tính bền vững cao
- c. Được tạo ra với số lượng rất nhỏ trong tế bào
- d. Là các liên kết yếu**

CHƯƠNG II: CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO BÀI TẾ BÀO CÓ NHÂN SƠ

1. Đặc điểm nào sau đây không phải của tế bào nhân sơ ?

- a. Có kích thước nhỏ
- b. Không có các bào quan như bộ máy Gôn gi , lưới nội chất
- c. Không có chứa phân tử ADN
- d. Nhân chưa có màng bọc**

2. Đặc điểm của tế bào nhân sơ là :

- a. Tế bào chất đã phân hoá chứa đủ các loại bào quan
- b. Màng nhân giúp trao đổi chất giữa nhân với tế bào chất
- c. Chưa có màng nhân**
- d. Cả a, b, c đều đúng

3. Cấu trúc nào sau đây thuộc loại tế bào nhân sơ ?

- a. Virut
- b. Tế bào thực vật
- c. Tế bào động vật
- d. Vi khuẩn**

4. Tế bào nhân sơ được cấu tạo bởi 3 thành phần chính là :

- a. Màng sinh chất , tế bào chất , vùng nhân**
- b. Tế bào chất, vùng nhân , các bào quan
- c. Màng sinh chất , các bào quan , vùng nhân
- d. Nhân phân hoá , các bào quan , màng sinh chất

5. Thành phần nào sau đây không có ở cấu tạo của tế bào vi khuẩn ?

- a. Màng sinh chất c. Vỏ nhày
- b. Mạng lưới nội chất d. Lông roi**
- 6. Phát biểu sau đây không đúng khi nói về vi khuẩn là :
- a. Dạng sống chưa có cấu tạo tế bào**

- b. Cơ thể đơn bào , tế bào có nhân sơ
- c. Bên ngoài tế bào có lớp vỏ nhày và có tác dụng bảo vệ
- d. Trong tế bào chất có chứa ribôxôm
7. Nhận định nào sau đây đúng với tế bào vi khuẩn
- a. Nhân được phân cách với phần còn lại của tế bào bởi màng nhân
- b. Vật chất di truyền là ADN không kết hợp với protôein histon.**
- c. Nhân có chứa phân tử ADN dạng vòng
- d. Ở vùng nhân không chứa nguyên liệu di truyền
8. Ở vi khuẩn , cấu trúc plasmis là :
- a. Phân tử ADN nằm trong nhân tế bào có dạng thẳng
- b. Phân tử ADN có dạng vòng nằm trong nhân
- c. Phân tử ADN nằm trong nhân tế bào có dạng vòng**
- d. Phân tử ADN thẳng nằm trong tế bào chất
9. Trong tế bào vi khuẩn nguyên liệu di truyền là ADN có ở :
- a. Màng sinh chất và màng ngăn
- b. Màng sinh chất và nhân
- c. Tế bào chất và vùng nhân**
- d. Màng nhân và tế bào chất
10. Hình thái của vi khuẩn được ổn định nhờ cấu trúc nào sau đây ?
- a. Vỏ nhày c. Màng sinh chất
- b. Thành tế bào d. Tế bào chất**
11. Thành phần hóa học cấu tạo nên thành tế bào vi khuẩn
- a. Xenlulôzơ **c. Peptidôglycan**
- b. Kitin d. Silic
12. Người ta chia làm 2 loại vi khuẩn , vi khuẩn gram âm và vi khuẩn gram dương dựa vào yếu tố sau đây ?
- a. Cấu trúc của phân tử ADN trong nhân
- b. Cấu trúc của plasmid
- c. Số lượng nhiễm sắc thể trong nhân hay vùng nhân
- d. Cấu trúc và thành phần hóa học của thành tế bào**
13. Cụm từ " tế bào nhân sơ " dùng để chỉ
- a. Tế bào không có nhân
- b. Tế bào có nhân phân hoá
- c. Tế bào chưa có màng ngăn cách giữa vùng nhân với tế bào chất**
- d. Tế bào nhiều nhân
13. Sinh vật dưới có cấu tạo tế bào nhân sơ là :
- a. Vi khuẩn lam c. Nấm**
- b. Tảo d. Động vật nguyên sinh
14. Trong tế bào vi khuẩn , ribôxôm có chức năng nào sau đây ?
- a. Hấp thụ các chất dinh dưỡng cho tế bào
- b. Tiến hành tổng hợp protôein cho tế bào**
- c. Giúp trao đổi chất giữa tế bào và môi trường sống
- d. Cả 3 chức năng trên
15. Chức năng di truyền ở vi khuẩn được thực hiện bởi :
- a. Màng sinh chất **c. Vùng nhân**

- b. Chất tế bào d. Ribôxôm

BÀI TẾ BÀO CÓ NHÂN CHUẨN (NHÂN THỰC)

1. Tế bào nhân chuẩn có ở :

- a. Động vật c. Người
b. Thực vật **d. Vi khuẩn**

2. Đặc điểm cấu tạo của tế bào nhân chuẩn khác với tế bào nhân sơ là :

- a. Có màng sinh chất
b. Có các bào quan như bộ máy Gôngi, lưới nội chất
c. Có màng nhân
d. Hai câu b và c đúng

3. Ở tế bào nhân chuẩn, tế bào chất được xoang hoá là do ;

- a. Có màng nhân ngăn cách chất nhân với tế bào chất
b. Có các bào quan có màng bọc phân cách với tế bào chất

- c. Có hệ thống mạng lưới nội chất
d. Có các ti thể.

4. Đặc điểm của cấu trúc màng nhân là :

- a. Không có ở tế bào nhân sơ
b. Có cấu tạo gồm 2 lớp
c. Có nhiều lỗ nhỏ giúp trao đổi chất giữa nhân và tế bào chất
d. Cả a,b, và c đều đúng

5. Cấu trúc dưới đây không có trong nhân của tế bào là :

- a. Chất dịch nhân
b. Nhân con
c. Bộ máy Gôngi
d. Chất nhiễm sắc

6. Thành phần hoá học của chất nhiễm sắc trong nhân tế bào là :

- a. ADN và prôtêin**
b. ARN và gluxit
c. Prôtêin và lipit
d. ADN và ARN

7. Trong dịch nhân có chứa

- a Ti thể và tế bào chất
b Tế bào chất và chất nhiễm sắc
c. Chất nhiễm sắc và nhân con
d. Nhân con và mạng lưới nội chất

8. Chất nào sau đây có chứa nhiều trong thành phần của nhân con ?

- a. axit đêôxiri bô nuclêic
b. axitribônuclêic
c. axit Photphoric
d. axit Ni tơ ric

9. Đường kính của nhân tế bào vào khoảng

- a. 0,5 micrômet c. 50 micrômet
b. 5 micrômet d. 5 ăngstron

10. Chất nhiễm sắc khi co xoắn lại sẽ hình thành cấu trúc nào sau đây ?

a. Phân tử ADN c. Nhiễm sắc thể

b. Phân tử prôtêin d. Ribôxôm

11. Điều sau đây sai khi nói về nhân con :

a. Cấu trúc nằm trong dịch nhân của tế bào

b. Có rất nhiều trong mỗi tế bào

c. Có chứa nhiều phân tử ARN

d. Thường chỉ có 1 trong mỗi nhân tế bào

12. Hoạt động nào sau đây là chức năng của nhân tế bào ?

a. Chứa đựng thông tin di truyền

b. Cung cấp năng lượng cho các hoạt động của tế bào

c. Vận chuyển các chất bài tiết cho tế bào

d. Duy trì sự trao đổi chất giữa tế bào và môi trường

Bỏ câu 13,14,15

16. Trong tế bào, Ribôxôm có thể tìm thấy ở trạng thái nào sau đây :

a. Đính trên màng sinh chất

b. Tự do trong tế bào chất

c. Liên kết trên lưới nội chất

d. Tự do trong tế bào chất và liên kết trên lưới nội chất

17. Thành phần hóa học của Ribôxôm gồm :

a. ADN,ARN và prôtêin

b. Prôtêin,ARN

c. Lipit,ADN và ARN

d. ADN,ARN và nhiễm sắc thể

18. Điều không đúng khi nói về Ribôxôm

a. Là bào quan không có màng bọc

b. Gồm hai hạt : một to, một nhỏ

c. Có chứa nhiều phân tử ADN

d. Được tạo bởi hai thành phần hóa học là prôtêin và ARN

19. Trong tế bào, hoạt động tổng hợp prôtêin xảy ra ở :

a. Ribôxôm c. Nhân

b. Lưới nội chất d. Nhân con

20. Đặc điểm có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật là :

a. Trong tế bào chất có nhiều loại bào quan

b. Có thành tế bào bằng chất xenlulôzo

c. Nhân có màng bọc

d. Cả a,b,c đều đúng

21. Cấu trúc nào sau đây có ở tế bào động vật

a. Không bào c. Thành xenlulôzo

b. Lục lạp d. Ti thể

22. Cấu trúc nào sau đây có ở tế bào động vật

a. Lưới nội chất c. Thành xenlulôzo

b. Không bào d. Nhân con

23. Cấu trúc dưới đây không có ở tế bào thực vật bậc cao là :

- a. Nhân chuẩn c. Trung thể
- b. Ribôxôm d. Nhân con

24. Một loại bào quan nằm ở gần nhân, chỉ có ở tế bào động vật và tế bào thực vật bậc thấp là :

- a. Lục lạp c. Không bào
- b. Ti thể d. Trung thể

25. Ở tế bào động vật số lượng trung tử có trong bào quang trung thể là:

- a.1 b.2 c.3 d.4

26. Trong tế bào trung thể có chức năng :

- a. Tham gia hình thành thoi vô sắc khi tế bào phân chia
- b. Chứa chất dự trữ cho tế bào
- c. Là nơi ô xi hoá các chất tạo năng lượng cho tế bào
- d. Bảo vệ tế bào

BÀI TẾ BÀO CÓ NHÂN CHUẨN (TIẾP THEO)

1. Bào quan có chức năng cung cấp năng lượng cho hoạt động tế bào là

- a. Không bào c. Nhân con
- b. Trung thể d. Ti thể

2. Trong tế bào sinh vật, ti thể có thể tìm thấy ở hình dạng nào sau đây?

- a. Hình cầu c. Hình hạt
- b. Hình que d. Nhiều hình dạng

3. Số lượng ti thể có chứa nhiều chất nào sau đây ?

- a. Hàng trăm c. Hàng trăm nghìn
- b. Hàng nghìn d. Hàng triệu

4. Ở lớp màng trong của ti thể có chứa nhiều chất nào sau đây ?

- a. Enzym hô hấp c. Kháng thể
- b. Hoocmon d. Sắc tố

5. Chất được chứa đựng trong lớp màng đôi của ti thể được gọi là :

- a. Chất vô cơ c. Chất nền
- b. Nước d. Muối khoáng

6. Chất sau đây không có trong thành phần của ti thể là :

- a. axit đêôxiribooniclêic

b. Prôtêin

c. axit photphoric

d. Peptidôglican

7. Loại bào quan có thể tìm thấy trong ti thể là :

- a. Lục lạp c. Bộ máy Gôn gi
- b. Ribôxom d. Trung thể

8. Tế bào nào trong các tế bào sau đây có chứa nhiều ti thể nhất ?

- a. Tế bào biểu bì c. Tế bào cơ tim
- b. Tế bào hồng cầu d. Tế bào xương

9. Sản phẩm chủ yếu được tạo ra từ hoạt động của ti thể là chất nào sau đây ?

- a. Pôlisaccharit

- b. axit nuclêic
- c. Các chất dự trữ
- d. năng lượng dự trữ**

BỎ 10,11,12,13

14. Điểm giống nhau về cấu tạo giữa lục lạp và ti thể trong tế bào là :

- a. Có chứa sắc tố quang hợp
- b. Có chứa nhiều loại enzym hô hấp
- c. Được bao bọc bởi lớp màng kép**
- d. Có chứa nhiều phân tử ATP

15. Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về lục lạp ?

- a. Có chứa nhiều trong các tế bào động vật
- b. Có thể không có trong tế bào của cây xanh
- c. Là loại bào quan nhỏ bé nhất
- d. Có chứa sắc tố diệp lục tạo màu xanh ở lá cây**

16. Chất nền của diệp lục có màu sắc nào sau đây ?

- a. Màu xanh
- b. Màu đỏ
- c. Màng trong của lục lạp
- d. Enzym quang hợp của lục lạp**

17. Tên gọi strôma để chỉ cấu trúc nào sau đây?

- a. Chất nền** của lục lạp
- b. Màng ngoài của lục lạp
- c. Màng trong của lục lạp
- d. Enzym quang hợp của lục lạp

18. Sắc tố diệp lục có chứa nhiều trong cấu trúc nào sau đây ?

- a. Chất nền
- b. Các túi tilacoit**
- c. Màng ngoài lục lạp
- d. Màng trong lục lạp

19. Trong lục lạp , ngoài diệp lục tố và Enzym quang hợp, còn có chứa

- a. ADN và ribôxôm**
- b. ARN và nhiễm sắc thể
- c. Không bào
- d. Photpholipit

BÀI TẾ BÀO CÓ NHÂN CHUẨN (TIẾP)

1. Cấu trúc trong tế bào bao gồm các ống và xoang贯通 với nhau được gọi là :

- a. Lưới nội chất**
- b. Chất nhiễm sắc
- c. Khung tế bào
- d. Màng sinh chất

2. Màng của lưới nội chất được tạo bởi các thành phần hóa học nào dưới đây ?

- a. Photpholipit và pôlisaccarit
- b. Prôtêin và photpholipit**

c. ADN,ARN và Photpholipit

d. Gluxit, prôtêin và chất nhuộm sắc

3. Trên màng lưới nội chất hạt có :

a. Nhiều hạt có khả năng nhuộm màu bằng dung dịch kiềm

b. Nhiều hạt có thể nhuộm bằng dung dịch a xít

c. Các Ribôxôm gắn vào

d. Cả a,b và c đều đúng

4. Trên màng lưới nội chất tron có chứa nhiều loại chất nào sau đây :

a. Enzim

b. Hoocmon

c. Kháng thể

d. Pôlisaccharit

5. Hoạt động nào sau đây xảy ra trên lưới nội chất hạt?

a. Ô xi hoá chất hữu cơ tạo năng lượng cho tế bào

b. Tổng hợp các chất bài tiết

c. Tổng hợp Pôlisaccharit cho tế bào

d. Tổng hợp Prôtêin

6. Chức năng của lưới nội chất tron là :

a. Phân huỷ các chất độc hại đối với cơ thể

b. Tham gia chuyển hoá đường

c. Tổng hợp lipit

d. Cả 3 chức năng trên

7. Cấu tạo bộ máy Gôn gi bao gồm :

a. các ống rãnh xếp chồng lên nhau và tách biệt nhau

b.

c. các cấu trúc dạng hạt tập hợp lại

d. các thể hình cầu có màng kép bao bọc

8. Chức năng của bộ máy Gôn gi trong tế bào là :

a. Thu nhận Prôtêin,lipit, đường rồi lắp ráp thành những sản phẩm cuối cùng

b. Phân phối các sản phẩm tổng hợp được đến các nơi trong tế bào .

c. Tạo chất và bài tiết ra khỏi tế bào

d. Cả a, b, và c đều đúng

9. Trong tế bào thực vật , bộ máy Gôn gi còn thực hiện chức năng nào sau đây ?

a. Tạo ra các hợp chất ATP

b. Tham gia quá trình tổng hợp thành xenlulôzo

c. Tổng hợp Prôtêin từ a xít amin

d. Tổng hợp các enzim cho tế bào

Bỏ câu 10,11

12. Loại bào quan dưới đây chỉ được bao bọc bởi 1 lớp màu đơn là :

a. Ti thể c. Lục lạp

b. Bộ máy Gôn gi d. Lizôxôm

13. Hoạt động dưới đây không phải chức năng của Lizôxôm.

a.Phân huỷ các tế bào cũng như các bào quan già

b. Phân huỷ các tế bào bị tổn thương không có khả năng phục hồi

c. Phân huỷ thức ăn do có nhiều en zim thuỷ phân

d. Tổng hợp các chất bài tiết cho tế bào

14. Hoạt động nào sau đây của Lizôxôm. cần phải kết hợp với không bào tiêu hoá ?

a. Phân huỷ thức ăn

b. Phân huỷ tế bào già

c. Phân huỷ các bào quan đã hết thời gian sử dụng

d. tất cả các hoạt động trên

15. Loại tế bào sau đây có chứa nhiều Lizôxôm. nhất là :

a. Tế bào cơ

b. Tế bào hồng cầu

c. Tế bào bạch cầu

d. Tế bào thần kinh

16. Điều sau đây đúng khi nói về không bào là :

a. là bào quan coa màng kép bao bọc

b. Có chứa nhiều trong tất cả tế bào động vật

c. Không có ở các tế bào thực vật còn non

d. Cả a,b và c đều sai

17. Điểm giống nhau về cấu tạo giữa Lizôxôm. và không bào là :

a. Bào quan có lớp màng kép bao bọc

b. Đều có kích thước rất lớn

c. Được bao bọc chỉ bởi một lớp màng đơn

d. Đều có trong tế bào của thực vật và động vật

18. Ở thực vật , không bào thực hiện chức năng nào sau đây ?

a. Chứa các chất dự trữ cho tế bào và cây

b. Chứa sắc tố tạo màu cho hoa

c. Bảo vệ tế bào và cây

d. Cả 3 chức năng trên

19. Cấu trúc nào sau đây có tác dụng tạo nên hình dạng xác định cho tế bào động vật ?

a. Mạng lưới nội chất

b. Bộ khung tế bào

c. Bộ máy Gôn gi

d. ti thể

20. Bộ Khung tế bào thực hiện chức năng nào sau đây ?

a. Giúp neo giữ các bào quan trong tế bào chất

b. vận chuyển các chất cho tế bào

c. Tham gia quá trình tổng hợp Prôtêin

d. Tiêu huỷ các tế bào già

BÀI TẾ BÀO CÓ NHÂN CHUẨN (TIẾP)

1. Hai nhà khoa học đã đưa ra mô hình cấu tạo màng sinh chất vào năm 1972 là :

a.Singer và Nicolson

b. Campbell và Singer

c. Nicolson và Reece

d.Reece và Campbell

2. Nội dung nào sau đây đúng khi nói về thành phần hoá học chính của màng sinh chất ?

- a. Một lớp photphorit và các phân tử prôtêin
b . Hai lớp photphorit và các phân tử prôtêin
c. Một lớp photphorit và không có prôtêin
d. Hai lớp photphorit và không có prôtêin
3. Trong thành phần của màng sinh chất, ngoài lipit và prôtêin còn có những phân tử nào sau đây ?
a. Axit ribônuclêic
b.Axit đêôxiribônuclêic
c. Cacbonhydrat
d. Axitphophoric
4. Ở tế bào động vật , trên màng sinh chất có thêm nhiều phân tử côlesteeron có tác dụng
a. Tạo ra tính cứng rắn cho màng
b. Làm tăng độ ẩm của màng sinh chất
c. Bảo vệ màng
d. Hình thành cấu trúc bền vững cho màng
5. Bên ngoài màng sinh chất còn có một lớp thành tế bào bao bọc . cấu tạo này có ở loại tế bào nào sau đây ?
a. Thực vật và động vật
b. Động vật và nấm
c. Nấm và thực vật
d. Động vật và vi khuẩn
6. Thành tế bào thực vật có thành phần hoá học chủ yếu bằng chất :
a. Xenlulôzo c.Côlesteron
b.Phôtpolipit d. Axit nuclêic
7. Tính vững chắc của thành tế bào nấm có được nhờ vào chất nào dưới đây ?
a. Cacbonhidrat c.Trigliêric
b. Kitin d. Protêin
- bỏ câu 8-15

BÀI VẬN CHUYỂN CHẤT QUA MÀNG TẾ BÀO

1. Điều dưới đây đúng khi nói về sự vận chuyển thụ động các chất qua màng tế bào là :
a. Cần có năng lượng cung cấp cho quá trình vận chuyển
b. Chất được chuyển từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao
c. Tuân thủ theo qui luật khuyếch tán
d. Chỉ xảy ra ở động vật không xảy ra ở thực vật
2. Vật chất được vận chuyển qua màng tế bào thường ở dạng nào sau đây ?
a. Hoà tan trong dung môi
b. Dạng tinh thể rắn
c. Dạng khí
d. Dạng tinh thể rắn và khí
3. Đặc điểm của sự vận chuyển chất qua màng tế bào bằng sự khuyếch tán là :
a. Chỉ xảy ra với những phân tử có đường kính lớn hơn đường kính của lỗ màng
b. Chất luôn vận chuyển từ nơi nhược trương sang nơi ưu trương

- c. là hình thức vận chuyển chỉ có ở tế bào thực vật
- d. **Dựa vào sự chênh lệch nồng độ các chất ở trong và ngoài màng**
4. Sự thẩm thấu là :
- Sự di chuyển của các phân tử chất tan qua màng
 - Sự khuyếch tán của các phân tử đường qua màng
 - Sự di chuyển của các ion qua màng
 - Sự khuyếch tán của các phân tử nước qua màng**
5. Câu có nội dung đúng sau đây là :
- Vật chất trong cơ thể luôn di chuyển từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao .
 - Sự vận chuyển chủ động trong tế bào cần được cung cấp năng lượng**
 - Sự khuyếch tán là 1 hình thức vận chuyển chủ động
 - Vận chuyển tích cực là sự thẩm thấu
6. Nguồn năng lượng nào sau đây trực tiếp cung cấp cho quá trình vận chuyển chất chủ động trong cơ thể sống ?
- ATP
 - ADP
 - AMP
 - Cả 3 chất trên
7. Sự vận chuyển chất dinh dưỡng sau quá trình tiêu hóa qua lông ruột vào máu ở người theo cách nào sau đây ?
- Vận chuyển khuyếch tán
 - Vận chuyển thụ động
 - Vận chuyển tích cực
 - Vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động**
8. Vận chuyển chất qua màng từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao là cơ chế :
- Thẩm thấu **c . Chủ động**
 - Khuyếch tán d. Thụ động
9. Hình thức vận chuyển chất dưới đây có sự biến dạng của màng sinh chất là:
- Khuyếch tán c . Thụ động
 - Thực bào** d. Tích cực

Chương 3

CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

BÀI SỰ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

1. Có hai dạng năng lượng được phân chia dựa trên trạng thái tồn tại của chúng là :
- Động năng và thế năng**
 - Hoá năng và điện năng
 - Điện năng và thế năng
 - Động năng và hoá năng
2. Thế năng là :
- Năng lượng giải phóng khi phân giải chất hữu cơ
 - Năng lượng ở trạng thái tiềm ẩn**
 - Năng lượng mặt trời
 - Năng lượng cơ học

3. Năng lượng tích luỹ trong các liên kết hoá học của các chất hữu cơ trong tế bào được gọi là :

- a. Hoá năng c. Nhiệt năng
- b. Điện năng d. Động năng

4. Adenôzin triphotphat là tên đầy đủ của hợp chất nào sau đây ?

- a. ADP c. ATP
- b. AMP d. Cả 3 trường hợp trên

5. Yếu tố nào sau đây không có trong thành phần của phân tử ATP?

- a. Bazonitric c. Đường
- b. Nhóm photphat d. Prôtêin

6. Đường cấu tạo của phân tử ATP là :

- a. Đêôxiribôzo c. Ribôzo
- b. Xenlulôzo d. Saccarôzo

8. Ngoài ba zơ nitric có trong phân tử còn lại của phân tử ATP là :

- a. 3 phân tử đường ribô và 1 nhóm photphat
- b. 1 phân tử đường ribô và 3 nhóm photphat
- c. 3 phân tử đường đêôxiribô và 1 nhóm photphat
- d. 1 phân tử đường đêôxiribô và 3 nhóm photphat

9. Năng lượng của ATP tích luỹ ở :

- a. Cả 3 nhóm photphat
- b. Hai liên kết photphat gần phân tử đường
- c. Hai liên kết photphat ở ngoài cùng
- d. Chỉ một liên kết photphat ngoài cùng

10. Quang năng là :

- a. Năng lượng của ánh sáng
- b. Năng lượng trong các liên kết photphat của ATP
- c. Năng lượng được sản sinh từ ôxi hoá của ti thể
- d. Năng lượng sản sinh từ phân huỷ ATP

11. Để tiến hành quangtổng hợp, cây xanh đã hấp thụ năng lượng nào sau đây?

- a. Hoá năng c. Điện năng
- b. Nhiệt năng d. Quang năng

12. Hoạt động nào sau đây không cần năng lượng cung cấp từ ATP?

- a. Sinh trưởng ở cây xanh
- b. Sự khuyếch tán chất qua màng tế bào
- c. Sự co cơ ở động vật
- d. Sự vận chuyển ôxi của hồng cầu ở người

13. Qua quang hợp tạo chất đường, cây xanh đã thực hiện quá trình chuyển hoá năng lượng nào sau đây ?

- a. Từ hoá năng sang quang năng
- b. Từ hoá năng sang quang năng
- c. Từ quang năng sang hoá năng
- d. Từ hoá năng sang nhiệt năng

BÀI VAI TRÒ CỦA ENZIM TRONG CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT

1. Hoạt động nào sau đây là của enzim?

a. Xúc tác các phản ứng trao đổi chất

b. Tham gia vào thành phần của các chất tổng hợp được

c. Điều hoà các hoạt động sống của cơ thể

d. Cả 3 hoạt động trên

2. Chất nào dưới đây là enzim ?

a. Saccaraza c. Prôteaza

b. Nuclêotiđaza d. Cả a, b, c đều đúng

3. Enzim có bản chất là:

a. Pôlisaccharit c. Prôtéin

b. Mônôsaccret d. Photpholipit

4. Phát biểu sau đây có nội dung đúng là :

a. Enzim là một chất xúc tác sinh học

b. Enzim được cấu tạo từ các disaccrit

c. Enzim sẽ lại biến đổi khi tham gia vào phản ứng

d. Ở động vật , Enzim do các tuyến nội tiết tiết ra

5. Cơ chất là :

a. Chất tham gia cấu tạo Enzim

b. Sản phẩm tạo ra từ các phản ứng cho do Enzim xúc tác

c. Chất tham gia phản ứng do Enzim xúc tác

d. Chất tạo ra do nhiều Enzim liên kết lại

6. Giai đoạn đầu tiên trong cơ chế tác dụng của Enzim lên các phản ứng là

a. Tạo các sản phẩm trung gian

b. Tạo ra Enzim - cơ chất

c. Tạo sản phẩm cuối cùng

d. Giải phóng Enzim khỏi cơ chất

7. Enzim có đặc tính nào sau đây?

a. Tính đa dạng

b. Tính chuyên hoá

c. Tính bền với nhiệt độ cao

d. Hoạt tính yếu

8. Enzim sau đây hoạt động trong môi trường a xít

a. Amilaza c. Pepsin

b. Saccaraza d. Mantaza

9. Khoảng nhiệt độ tối ưu cho hoạt động của Enzim trong cơ thể người là:

a. 15 độ C- 20 độ Cc. 20 độ C- 35 độ C

b. 20 độ C- 25 độ C d. 35 độ C- 40 độ C

10. Trong ảnh hưởng của nhiệt độ lên hoạt động của Enzim , thì nhiệt độ tối ưu của môi trường là giá trị nhiệt độ mà ở đó :

a. Enzim bắt đầu hoạt động

b. Enzim ngừng hoạt động

c. Enzim có hoạt tính cao nhất

d. Enzim có hoạt tính thấp nhất

11. Khi môi trường có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ tối ưu của Enzim, thì điều nào sau đây đúng ?

a. Hoạt tính Enzim tăng theo sự gia tăng nhiệt độ

b. Sự giảm nhiệt độ làm tăng hoạt tính Enzim

c. Hoạt tính Enzim giảm khi nhiệt độ tăng lên

d. Nhiệt độ tăng lên không làm thay đổi hoạt tính Enzim

12. Hậu quả sau đây sẽ xảy ra khi nhiệt độ môi trường vượt quá nhiệt độ tối ưu của Enzim là :

a. Hoạt tính Enzim tăng lên

b. Hoạt tính Enzim giảm dần và có thể mất hoàn toàn

c. Enzim không thay đổi hoạt tính

d. Phản ứng luôn dừng lại

13. Phần lớn Enzim trong cơ thể có hoạt tính cao nhất ở khoảng giá trị của độ pH nào sau đây ?

a. Từ 2 đến 3 **c. Từ 6 đến 8**

b. Từ 4 đến 5 d. Trên 8

14. Yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng đến hoạt tính của Enzim?

a. Nhiệt độ

b. Độ PH của môi trường

c. Nồng độ cơ chất và nồng độ Enzim

d. Cả 3 yếu tố trên

15. Enzim xúc tác quá trình phân giải đường saccôzo là :

a. Saccaraza c. Lactaza

b. Urêaza d. Enterôkinaza

16. Enzim Prôtêaza có tác dụng xúc tác quá trình nào sau đây ?

a. Phân giải lipit thành axit béo và glixêin

b. Phân giải đường đi saccarit thành mônôsaccarit

c. Phân giải đường lactôzo

d. Phân giải prôtêin

17. Quá trình phân giải axit nuclêic thành nuclêotit được xúc tác bởi Enzim

a. Nuclêotiđaza c. Peptidaza

b. Nuclêaza d. aza Amilaza

BÀI HÔ HẤP TẾ BÀO

1. Ở những tế bào có nhân chuẩn, hoạt động hô hấp xảy ra chủ yếu ở loại bào quan nào sau đây ?

a. Ti thể c. Không bào

b. Bộ máy Gôngi d. Ribôxôm

2. Sản phẩm của sự phân giải chất hữu cơ trong hoạt động hô hấp là :

a. Ôxi, nước và năng lượng

b. Nước, đường và năng lượng

c. Nước, khí cacbônic và đường

d. Khí cacbônic, nước và năng lượng

3. Cho một phương trình tổng quát sau đây :



Phương trình trên biểu thị quá trình phân giải hoàn toàn của 1 phân tử chất

- a. Disaccarit c. Prôtêin
 b.Glucôzơ d. Pôlisaccarit
4. Năng lượng chủ yếu được tạo ra từ quá trình hô hấp là
 a. ATP c. NADH
 b. ADP d. FADHz
5. Chất nào sau đây có thể được phân giải trong hoạt động hô hấp tế bào ?
 a. Mônsacrit c. Protêin
 b. Lipit d. **Cả 3 chất trên**
5. Sơ đồ tóm tắt nào sau đây thể hiện đúng quá trình đường phân
 a. Glocôzơ axit piruvic + năng lượng
 b. Glocôzơ CO2+ năng lượng
 c. Glocôzơ Nước + năng lượng
 d. Glocôzơ CO2+ nước
7. Năng lượng giải phóng khi tế bào tiến hành đường phân 1 phân tử glucôzơ là :
 a. Hai phân tử ADP
 b. Một phân tử ADP
c. Hai phân tử ATP
 d. Một phân tử ATP
- 8 . Quá trình đường phân xảy ra ở :
 a. Trên màng của tế bào
b. Trong tế bào chất
 c. Trong tất cả các bào quan khác nhau
 d. Trong nhân của tế bào
9. Quá trình ô xi hoá tiếp tục axit piruvic xảy ra ở
 a. Màng ngoài của ti thể
b. Trong chất nền của ti thể
 c. Trong bộ máy Gôen gi
 d. Trong các ribôxôm
10. Trong tế bào các a xít piruvic được ôxi hoá để tạo thành chất (A). Chất (A) sau đó đi vào chu trình Crep. Chất (A) là :
 a. axit lactic c. Axêtyl-CoA
 b. axit axêticd. Glucôzơ
11. Trong chu trình Crep, mỗi phân tử axeetyl-CoA được oxi hoá hoàn toàn sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử CO2?
 a. 4 phân tử **c. 2 phân tử**
 b. 3 phân tử d. 1 phân tử
 bỏ câu 12, 13
15. Trong hoạt động hô hấp tế bào , nước được tạo ra từ giai đoạn nào sau đây?
 a. Đường phân c. **Chuyển điện tử**
 b. Chu trình Crep d. a và b đúng

bui quang hiph

1. Quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ thông qua sử dụng năng lượng của ánh sáng được gọi là :
- Hoá tổng hợp
 - Quang tổng hợp**
 - Hoá phân li
 - Quang phân li
2. Ngoài cây xanh dạng sinh vật nào sau đây có khả năng quang hợp ?
- Ví khuẩn lưu huỳnh
 - Ví khuẩn chứa diệp lục và tảo**
 - Nấm
 - Động vật
3. Chất nào sau đây được cây xanh sử dụng làm nguyên liệu của quá trình quang hợp
- Khí ôxi và đường
 - Đường và nước
 - Đường và khí cabônic
 - Khí cabônic và nước**
4. Phát biểu sau đây có nội dung đúng là :
- Trong quang hợp, cây hấp thụ O₂ để tổng hợp chất hữu cơ
 - Quang hợp là sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu cơ
 - Một trong các sản phẩm của quang hợp là khí O₂**
 - Nguyên liệu của quang hợp là H₂O và O₂
- Bỏ câu 5,6,7
8. Loại sắc tố sau đây hấp thụ được ánh sáng là :
- Clôroophin
 - Carôtenôit
 - Phicôbilin**
 - Cả 3 sắc tố trên**
9. Chất diệp lục là tên gọi của sắc tố nào sau đây :
- Sắc tố carôtenôit
 - Phicôbilin
 - Clôroophin**
 - Carôtenôit
10. Sắc tố carôtenôit có màu nào sau đây ?
- Xanh lục
 - Da cam**
 - Nâu
 - Xanh da trời
11. Phát biểu sau đây đúng khi nói về cơ chế của quang hợp là :
- Pha sáng diễn ra trước , pha tối sau**
 - Pha tối xảy ra trước, pha sáng sau
 - Pha sáng và pha tối diễn ra đồng thời
 - Chỉ có pha sáng , không có pha tối
12. Pha sáng của quang hợp diễn ra ở
- Trong các túi dẹp (tilacôit) của các hạt grana**
 - Trong các nền lục lạp
 - Ở màng ngoài của lục lạp
 - Ở màng trong của lục lạp
13. Hoạt động sau đây không xảy ra trong pha sáng của quang hợp là :
- Diệp lục hấp thụ năng lượng ánh sáng
 - Nước được phân li và giải phóng điện tử
 - Cacbon hidrat được tạo ra**
 - Hình thành ATP
14. Trong quang hợp , ôxi được tạo ra từ quá trình nào sau đây ?

a. Hấp thụ ánh sáng của diệp lục

b. Quang phân li nước

c. Các phản ứng ôxi hoá khử

d. Truyền điện tử

15. Trong pha sáng của quang hợp, nước được phân li nhờ :

a. Sự gia tăng nhiệt độ trong tế bào

b. Năng lượng của ánh sáng

c. Quá trình truyền điện tử quang hợp

d. Sự xúc tác của diệp lục

16. Trong pha sáng của quá trình quang hợp, ATP và NADPH được trực tiếp tạo ra từ hoạt động nào sau đây?

a. Quang phân li nước.

b. Diệp lục hấp thu ánh sáng trở thành trạng thái kích động

c. Hoạt động của chuỗi truyền điện tử

d. Hấp thụ năng lượng của nước

17. Kết quả quan trọng nhất của pha sáng quang hợp là :

a. Các điện tử được giải phóng từ phân li nước

b. Sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng

c. Sự giải phóng ôxít.

d. Sự tạo thành ATP và NADPH

18. Pha tối quang hợp xảy ra ở :

a. Trong chất nền của lục lạp

b. Trong các hạt grana

c. Ở màng của các túi tilacôit

d. Ở trên các lớp màng của lục lạp

19. Nguồn năng lượng cung cấp cho các phản ứng trong pha tối chủ yếu lấy từ:

a. Ánh sáng mặt trời

b. ATP do các ti thể trong tế bào cung cấp

c. ATP và NADPH từ pha sáng đưa sang

d. Tất cả các nguồn năng lượng trên

20. Hoạt động sau đây xảy ra trong pha tối của quang hợp là :

a. Giải phóng ôxi

b. Biến đổi khí CO₂ hấp thụ từ khí quyển thành cacbonhidrat

c. Giải phóng điện tử từ quang phân li nước

d. Tổng hợp nhiều phân tử ATP

21. Chu trình nào sau đây thể hiện cơ chế các phản ứng trong pha tối của quá trình quang hợp?

a. Chu trình Canvin

b. Chu trình Crep

c. Chu trình Cnôp

d. Tất cả các chu trình trên

22. Câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là:

a. Cabonhidrat được tạo ra trong pha sáng của quang hợp

b. Khí ôxi được giải phóng từ pha tối của quang hợp

c. ATP và NADPH không được tạo ra từ pha sáng

d. Cả a, b, c đều có nội dung sai

BÀI HÓA TỔNG HỢP

1. Hiện tượng hoá tổng hợp được tìm thấy ở :
 - a. Thực vật bậc thấp **c. Một số vi khuẩn**
 - b. Thực vật bậc cao d. Động vật
2. Giống nhau giữa quang hợp với hoá tổng hợp là :
 - a. Đều sử dụng nguồn năng lượng của ánh sáng
 - b. Đều sử dụng nguồn năng lượng hoá học
 - c. Đều sử dụng nguồn nguyên liệu CO₂**
 - d. Đều sử dụng nguồn nguyên liệu
3. Hiện tượng xảy ra ở quang hợp mà không có ở hoá tổng hợp là :
 - a. Có sử dụng năng lượng của ánh sáng**
 - b. Sản phẩm tạo ra cacbonhidrat
 - c. Nguồn cacbon sử dụng cho quá trình là CO₂
 - d. Xảy ra trong tế bào sống
4. Phát biểu sau đây đúng khi nói về hoá tổng hợp là :
 - a. Có ở mọi cơ thể sống
 - b. Sản phẩm tạo ra không có ôxi**
 - c. Cơ chế bao gồm pha sáng và pha tối
 - d. Xảy ra trong lục lạp
5. Vi khuẩn sau đây không có khả năng hoá tổng hợp là :
 - a. Vi khuẩn lưu huỳnh
 - b. Nitrosomonas
 - c. Nitrobacter
 - d. Vi khuẩn diệp lục**
6. Vi khuẩn lưu huỳnh có vai trò nào sau đây ?
 - a. Góp phần bổ sung O₂ cho khí quyển
 - b. Làm tăng H₂S trong môi trường sống
 - c. Cung cấp nguồn O₂ cho quang hợp
 - d. Góp phần làm sạch môi trường nước**
7. Sinh vật dưới đây có hoạt động tổng hợp cacbonhidrat khác với các sinh vật còn lại :
 - a. Cây xanh
 - b. Táo
 - c. Vi khuẩn sắt**
 - d. Vi khuẩn diệp lục
8. Hoạt động nào sau đây của vi khuẩn nitrobacter
 - a. Ôxi hoá H₂S
 - b. Ôxi hoá thành nitrat**
 - c. Ôxi hoá sắt hoá trị 2 thành sắt hoá trị 3
 - d. Ôxi hoá amôniac thành nitrit

Chương 4

Phân chia tinh bột

Bùi nguyễn phong vũ c,c chu kx tō bμo

1.Trình tự các giai đoạn mà tế bào trải qua trong khoảng thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp được gọi là :

- a. Quá trình phân bào c. Phát triển tế bào
- b. Chu kỳ tế bào d. Phân chia tế bào

2.Thời gian của một chu kỳ tế bào được xác định bằng :

- a. Thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp
- b. Thời gian kì trung gian
- c. Thời gian của quá trình nguyên phân
- d. Thời gian của các quá trình chính thức trong một lần nguyên phân

3. Trong một chu kỳ tế bào , thời gian dài nhất là của :

- a. Kì cuối c. Kì đầu
- b. Kì giữa d. Kì trung gian

4. Trong 1 chu kỳ tế bào , kỳ trung gian được chia làm :

- a. 1 pha c. 3 pha
- b. 2 pha d. 4 pha

5.Hoạt động xảy ra trong pha G1 của kỳ trung gian là :

- a. Sự tổng hợp thêm tế bào chất và bào quan

b. Trung thể tự nhân đôi

c. ADN tự nhân đôi

d. Nhiễm sắc thể tự nhân đôi

6. Các nhiễm sắc thể tự nhân đôi ở pha nào sau đây của kỳ trung gian?

- a. Pha G1 c. Pha G2
- b. Pha S d. Pha G1 và pha G2

6. Thứ tự lần lượt trước - sau của tiến trình 3 pha ở kỳ trung gian trong một chu kỳ tế bào là :

- a. G2,G2,S c. S,G2,G1
- b. S,G1,G2 d. G1,S,G2

7. Nguyên nhân là hình thức phân chia tế bào không xảy ra ở loại tế bào nào sau đây ?

- a. Tế bào vi khuẩn c. Tế bào thực vật

b. Tế bào động vật d. Tế bào nấm

8. Diễn biến nào sau đây đúng trong nguyên phân ?

- a. Tế bào phân chia trước rồi đên nhân phân chia
- b. Nhân phân chia trước rồi mới phân chia tế bào chất

c. Nhân và tế bào phân chia cùng lúc

d. Chỉ có nhân phân chia còn tế bào chất thì không

9. Quá trình phân chia nhân trong một chu kỳ nguyên phân bao gồm

- a. Một kỳ c. Ba kỳ
- b. Hai kỳ d. Bốn kỳ

10. Thứ tự nào sau đây được sắp xếp đúng với trình tự phân chia nhân trong nguyên phân ?

- a. Kỳ đầu , kỳ sau , kỳ cuối , kỳ giữa
- b. Kỳ sau ,kỳ giữa ,Kỳ đầu , kỳ cuối
- c. Kỳ đầu , kỳ giữa , kỳ sau , kỳ cuối

d. Kỳ giữa , kỳ sau , kỳ đầu , kỳ cuối

12 . Kỳ trước là kỳ nào sau đây ?

a. Kỳ đầu c. Kỳ sau

b. Kỳ giữa d. Kỳ cuối

13. Trong kỳ đầu của nguyên nhân , nhiễm sắc thể có hoạt động nào sau đây ?

a. Tự nhân đôi tạo nhiễm sắc thể kép

b. Bắt đầu co xoắn lại

c. Co xoắn tối đa

d. Bắt đầu dần xoắn

14. Thoi phân bào bắt đầu được hình thành ở :

a. Kỳ đầu c. Kỳ sau

b. Kỳ giữa d. Kỳ cuối

15. Hiện tượng xảy ra ở kỳ đầu của nguyên phân là :

a. Màng nhân mờ dần rồi tiêu biến đi

b. Các NST bắt đầu co xoắn lại

c. Thoi phân bào bắt đầu xuất hiện

d. Cả a, b, c đều đúng

16. Trong kỳ đầu , nhiễm sắc thể có đặc điểm nào sau đây ?

a. Đều ở trạng thái đơn co xoắn

b. Một số ở trạng thái đơn , một số ở trạng thái kép

c. Đều ở trạng thái kép

d. Đều ở trạng thái đơn , dây xoắn

17. Thoi phân bào được hình thành theo nguyên tắc

a. Từ giữa tế bào lan dần ra

b. Từ hai cực của tế bào lan vào giữa

c. Chi hình thành ở 1 cực của tế bào

d. Chỉ xuất hiện ở vùng tâm tế bào

18. Trong kỳ giữa , nhiễm sắc thể có đặc điểm

a. Ở trạng thái kép bắt đầu có co xoắn

b. Ở trạng thái đơn bắt đầu có co xoắn

c. Ở trạng thái kép có xoắn cực đại

d. Ở trạng thái đơn có xoắn cực đại

19. Hiện tượng các nhiễm sắc thể xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào xảy ra vào :

a. Kỳ cuối c. Kỳ trung gian

b. Kỳ đầu **d. Kỳ giữa**

20. Trong nguyên phân khi nằm trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào , các nhiễm sắc thể xếp thành :

a. Một hàng c. Ba hàng

b. Hai hàng d. Bốn hàng

21. Nhiễm sắc thể có hình thái đặc trưng và dễ quan sát nhất vào :

a. Kỳ giữa c. Kỳ sau

b. Kỳ cuối d. Kỳ đầu

22. Các nhiễm sắc thể dính vào tia thoi phân bào nhờ :

a. Eo sơ cấp **c. Tâm động**

b. Eo thứ cấp d. Đầu nhiễm sắc thể

23. Những kỳ nào sau đây trong nguyên phân, nhiễm sắc thể ở trạng thái kép ?

a. Trung gian, đầu và cuối

b. Đầu, giữa , cuối

c. **Trung gian , đầu và giữa**

d. Đầu, giữa , sau và cuối

Bỏ câu 24,25,26

27. Bào quan sau đây tham gia vào việc hình thành thoi phân bào là :

a. **Trung thể** c. Không bào

b. Ti thể d. Bộ máy Gôn gi

28. Cụ phân li nhiễm sắc thể trong nguyên phân xảy ra ở

a. Kỳ đầu c. Kỳ trung gian

b. **Kỳ sau** d. Kỳ cuối

29. Hiện tượng các nhiễm sắc thể kép co xoắn cực đại ở kỳ giữa nhằm chuẩn bị cho hoạt động nào sau đây?

a. **Phân li nhiễm sắc thể**

b. Nhân đôi nhiễm sắc thể

c. Tiếp hợp nhiễm sắc thể

d. Trao đổi chéo nhiễm sắc thể

30. Hoạt động của nhiễm sắc thể xảy ra ở kỳ sau của nguyên phân là :

a. **Tách tâm động và phân li về2 cực của tế bào**

b. Phân li về 2 cực tế bào ở trạng thái kép

c. Không tách tâm động và dãn xoắn

d. Tiếp tục xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

31. Các tế bào con tạo ra nguyên nhân có số nhiễm sắc thể bằng với phân tử tế bào

a. Nhân đôi và co xoắn nhiễm sắc thể

b. **Nhân đôi và phân li nhiễm sắc thể**

c. Phân li và dãn xoắn nhiễm sắc thể

d. Co xoắn và dãn xoắn nhiễm sắc thể

32. Trong chu kỳ nguyên phân trạng thái đơn của nhiễm sắc thể tồn tại ở :

a. Kỳ đầu và kì cuối c. **Kỳ sau và kỳ cuối**

b. Kỳ sau và kì giữa d. Kỳ cuối và kỳ giữa

33. Khi hoàn thành kỳ sau , số nhiễm sắc thể trong tế bào là :

a. **4n, trạng thái đơn** c. 4n, trạng thái kép

b. 2n, trạng thái đơn d. 2n, trạng thái đơn

34. Hiện tượng sau đây xảy ra ở kỳ cuối là :

a. Nhiễm sắc thể phân li về cực tế bào

b. **Màng nhân và nhân con xuất hiện**

c. Các nhiễm sắc thể bắt đầu co xoắn

d. Các nhiễm sắc thể ở trạng thái kép

35 . Hiện tượng dãn xoắn nhiễm sắc thể xảy ra vào :

a. Kỳ giữa c. Kỳ sau

b. Kỳ đầu d. **Kỳ cuối**

36. Hiện tượng không xảy ra ở kỳ cuối là:

a. Thoi phân bào biến mất

- b. các nhiễm sắc thể đơn dãn xoắn
 c. Màng nhân và nhân con xuất hiện
d. Nhiễm sắc thể tiếp tục nhân đôi

Bỏ câu 37,38,39

39. (C) là :

- a. Giảm một nửa c. Bằng nhau
 b. tăng gấp đôi d. tăng gấp bốn

40. Gà có $2n=78$. Vào kỳ trung gian, sau khi xảy ra tự nhân đôi, số nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào là :

- a. 78 nhiễm sắc thể đơn
b. 78 nhiễm sắc thể kép
 c. 156 nhiễm sắc thể đơn
 d. 156 nhiễm sắc thể kép

41. Trong tế bào của một loài, vào kỳ giữa của nguyên phân, người ta xác định có tất cả 16 crôma tít. Loài đó có tên là :

- a. Người **c. Ruồi giấm**
 b. Đậu Hà Lan d. Lúa nước

42. Vào kỳ sau của nguyên phân, trong mỗi tế bào của người có :

- a. 46 nhiễm sắc thể đơn
 b. 92 nhiễm sắc thể kép
 c. 46 crômatit
d. 92 tâm động

Bỏ 43,44,45

BÀI GIẢM PHÂN

1. Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở loại tế bào nào sau đây?

- a. Tế bào sinh dưỡng c. Giao tử
b. Tế bào sinh dục chín d. Tế bào xô ma

2. Đặc điểm có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân là :

- a. Xảy ra sự biến đổi của nhiễm sắc thể**

- b. Có sự phân chia của tế bào chất
 c. Có 2 lần phân bào
 d. Nhiễm sắc thể tự nhân đôi

3. Điểm giống nhau giữa nguyên phân và giảm phân là :

- a. Đều xảy ra ở tế bào sinh dưỡng
 b. Đều xảy ra ở tế bào sinh dục chín
c. Đều có một lần nhân đôi nhiễm sắc thể

- d. Cả a, b, c đều đúng

4. Phát biểu sau đây đúng khi nói về giảm phân là :

- a. Có hai lần nhân đôi nhiễm sắc thể
 b. Có một lần phân bào
 c. Chỉ xảy ra ở các tế bào xô ma
d. Tế bào con có số nhiễm sắc thể đơn bội

Bỏ câu 5,6,7

8. Trong giảm phân , nhiễm sắc thể tự nhân đôi vào :

- a. Kỳ giữa I
- b. Kỳ trung gian trước lần phân bào I**
- c. Kỳ giữa II

d. Kỳ trung gian trước lần phân bào II

9. Trong giảm phân các nhiễm sắc thể xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào ở :

- a. Kỳ giữa I và sau I
- b. Kỳ giữa II và sau II

c. Kỳ giữa I và sau II

d. Kỳ giữa I và sau II

10. Trong giảm phân , ở kỳ sau I và kỳ sau II có điểm giống nhau là :

a. Các nhiễm sắc thể đều ở trạng thái đơn

b. Các nhiễm sắc thể đều ở trạng thái kép

c. Sự dãn xoắn của các nhiễm sắc thể

d. Sự phân li các nhiễm sắc thể về 2 cực tế bào

11. Vào kỳ đầu của quá trình giảm phân I xảy ra hiện tượng nào sau đây ?

a. Các nhiễm sắc thể kép bắt đầu co xoắn

b. Thoi vô sắc đã được hình thành hoàn chỉnh

c. Màng nhân trở nên rõ rệt hơn

d. Các nhiễm sắc thể tự nhân đôi

12. Ở kỳ đầu I của giảm phân , các nhiễm sắc thể có hoạt động khác với quá trình nguyên phân là :

a. Co xoắn dần lại c. Gồm 2 crôntit dính nhau

b. Tiếp hợp d. Cả a,b,c đều đúng

13. Vào kỳ giữa I của giảm phân và kỳ giữa của nguyên phân có hiện tượng giống nhau là :

a. Các nhiễm sắc thể xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

b. Nhiễm sắc thể dãn xoắn

c. Thoi phân bào biến mất

d. Màng nhân xuất hiện trở lại

14. Các nhiễm sắc thể kép xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào thành mấy hàng ?

a. Một hàng c. Ba hàng

b. Hai hàng d. Bốn hàng

15. Đặc điểm có ở kỳ giữa I của giảm phân và sóng có ở kỳ giữa của nguyên phân là :

a. Các nhiễm sắc thể co xoắn tối đa

b. Nhiễm sắc thể ở trạng thái kép

c. Hai nhiễm sắc thể kép tương đồng xếp song song với nhau trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

d. Nhiễm sắc thể sắp xếp 1 hàng trên thoi phân bào

16. Sự tiếp hợp va ftrao đổi chéo nhiễm sắc thể diễn ra ở kỳ nào trong giảm phân ?

a. Kỳ đầu I c. Kỳ giữa I

b. Kỳ đầu II d. Kỳ giữa II

16. Phát biểu sau đây đúng với sự phân li của ácc nhiễm sắc thể ở kỳ sau I của giảm phân là :

- a. Phân li ở trạng thái đơn
- b. Phân li nhưng không tách tâm động**
- c. Chỉ di chuyển về 1 cực của tế bào
- d. Tách tâm động rồi mới phân li

17. Kết thúc kỳ sau I của giảm phân , hai nhiễm sắc thể kép cùng cập tương đồng có hiện tượng :

- a. Hai chiếc cùng về một cực tế bào
- b. Một chiếc về cực và 1 chiếc ở giữa tế bào
- c. Mỗi chiếc về 1 cực tế bào**
- d. Đều nằm ở giữa tế bào

19. Kết thúc lần phân bào I trong giảm phân , các nhiễm sắc thể trong tế bào ở trạng thái :

- a. Đơn, dãn xoắn c. Kép , dãn xoắn
- b. Đơn co xoắn **d. Kép , co xoắn**

20. Đặc điểm của lần phân bào II trong giảm phân là :

- a. Không xảy ra tự nhân đôi nhiễm sắc thể**
- b. Các nhiễm sắc thể trong tế bào là $2n$ ở mỗi kỳ
- c. Các nhiễm sắc thể trong tế bào là n ở mỗi kì
- d. Có xảy ra tiếp hợp nhiễm sắc thể

21. Trong lần phân bào II của giảm phân , các nhiễm sắc thể có trạng thái kép ở các kỳ nào sau đây ?

- a. Sau II, cuối II và giữa II
- b. Đầu II, cuối II và sau II
- c. Đầu II, giữa II**
- d. Tất cả các kỳ

22. Trong quá trình giảm phân , các nhiễm sắc thể chuyển từ trạng thái kép trở về trạng thái đơn bắt đầu từ kỳ nào sau đây ?

- a. Kỳ đầu II **c. Kỳ sau II**
- b. Kỳ giữa II d. Kỳ cuối II

23. Trong giảm phân , cấu trúc của nhiễm sắc thể có thể thay đổi từ hiện tượng nào sau đây ?

- a. Nhân đôi c. Tiếp hợp
- b. Trao đổi chéo** d. Co xoắn

24. Ý nghĩa của sự trao đổi chéo nhiễm sắc thể trong giảm phân về mặt di truyền là :

- a. Làm tăng số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào
- b. Tạo ra sự ổn định về thông tin di truyền
- c. Góp phần tạo ra sự đa dạng về kiểu gen ở loài**
- d. Duy trì tính đặc trưng về cấu trúc nhiễm sắc thể

Bỏ 25-28

29. Trong 1 tế bào sinh dục của 1 loài đang ở kỳ giữa I , người ta đếm có tất cả 16 crômatit. tên của loài nói trên là :

- a. Đầu Hà Lan **c. Ruồi giấm**
- b. Bắp d. Củ cải

30. Số tinh trùng được tạo ra nếu so với số tế bào sinh tinh thì :

- a. Bằng nhau c. Bằng 2 lần
b. Bằng 4 lần d. Giảm một nửa

31. Có 5 tế bào sinh dục chín của một loài gián phân. Biết số nhiễm sắc thể của loài là $2n=40$. Số tế bào con được tạo ra sau gián phân là :

- a. 5 b. 10 c. 15 **d. 20**

PHẦN III: SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG 1: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT

BÀI KIẾU DINH DƯỠNG VÀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT Ở VI SINH VẬT

1. Dựa vào nhu cầu của vi sinh vật đối với nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu, người ta phân chia làm mấy nhóm vi sinh vật ?

- a. 1 b. 2 c. 3 **d. 4**

2. Các vi sinh vật có hình thức quang tự dưỡng là :

- a. Tảo , các vi khuẩn chứa diệp lục**

b. Nấm và tất cả vi khuẩn

c. Vi khuẩn lưu huỳnh

d. Cả a,b,c đều đúng

3. Hình thức dinh dưỡng bằng nguồn cacbon chủ yếu là CO_2 , và năng lượng của ánh sáng được gọi là:

- a. Hoá tự dưỡng **c. Quang tự dưỡng**

- b. Hoá dị dưỡng d. Quang dị dưỡng

4. Vi khuẩn lam dinh dưỡng dựa vào nguồn nào sau đây ?

a. Ánh sáng và chất hữu cơ

b. CO_2 và ánh sáng

c. Chất vô cơ và CO_2

d. Ánh sáng và chất vô cơ

5. Quang dị dưỡng có ở :

- a. Vi khuẩn màu tía** c. Vi khuẩn sắt

- b. Vi khuẩn lưu huỳnh d. Vi khuẩn nitrat hoá

bỏ câu 6,7

8. Vi sinh vật vào sau đây có kiểu dinh dưỡng khác với các vi sinh vật còn lại ?

a. Tảo đơn bào

b. Vi khuẩn nitrat hoá

c. Vi khuẩn lưu huỳnh

d. Vi khuẩn sắt

9. Kiểu dinh dưỡng dựa vào nguồn năng lượng từ chất vô cơ và nguồn cacbon CO_2 , được gọi là :

a. Quang dị dưỡng

b. Hoá dị dưỡng

c. Quang tự dưỡng

d. Hoá tự dưỡng

10. Tự dưỡng là :

a. Tự dưỡng tổng hợp chất vô cơ từ chất hữu cơ

b. Tự dưỡng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ

- c. Tổng hợp chất hữu cơ này từ chất hữu cơ khác
d. Tổng hợp chất vô cơ này từ chất vô cơ khác

11. Vì sinh vật sau đây có lối sống tự dưỡng là :

- a. Tảo đơn bào
b. Vi khuẩn lưu huỳnh
c. Vi khuẩn nitrat hoá
d. Cả a,b,c đều đúng

12. Vì sinh vật sau đây có lối sống dị dưỡng là :

- a. Vi khuẩn chúa diệp lục c. Tảo đơn bào
b. Vi khuẩn lam **d. Nấm**

13. Quá trình oxi hoá các chất hữu cơ mà chất nhận điện tử cuối cùng là ôxi phân tử, được gọi là :

- a. Lên men **c. Hô hấp hiếu khí**
b. Hô hấp d. Hô hấp kị khí

14. Quá trình phân giải chất hữu cơ mà chính những phân tử hữu cơ đó vừa là chất cho vừa là chất nhận điện tử ; không có sự tham gia của chất nhận điện tử từ bên ngoài được gọi là :

- a. Hô hấp hiếu khí c. Đồng hoá
b. Hô hấp kị khí **d. Lên men**

15. Trong hô hấp kị khí , chất nhận điện tử cuối cùng là :

- a. Ôxi phân tử
b. Một chất vô cơ như NO₂, CO₂
c. Một chất hữu cơ
d. Một phân tử cacbonhidrat

16. Giống nhau giữa hô hấp , và lên men là :

- a. Đều là sự phân giải chất hữu cơ**
b. Đều xảy ra trong môi trường có nhiều ôxi
c. Đều xảy ra trong môi trường có ít ôxi
d. Đều xảy ra trong môi trường không có ôxi
17. Hiện tượng có ở hô hấp mà không có ở lên men là :
- a. Giải phóng năng lượng từ quá trình phân giải
b. Không sử dụng ôxi
c. Có chất nhận điện tử từ bên ngoài
d. Cả a, b,c đều đúng

18. Hiện tượng có ở lên men mà không có ở hô hấp là :

- a. Có chất nhận điện tử là ôxi phân tử
b. Có chất nhận điện tử là chất vô cơ
c. Không giải phóng ra năng lượng

d. Không có chất nhận điện tử từ bên ngoài

19. Nguồn chất hữu cơ được xem là nguyên liệu trực tiếp của hai quá trình hô hấp và lên men là :

- a. Prôtêin c. Photpholipit
b. **Cacbonhidrat** d. axit béo

BÀI QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI SINH VẬT

1. Loại vi sinh vật tổng hợp axit glutamic từ glucôzơ là :
 - a. Nấm men c. Xạ khuẩn
 - b. Vi khuẩn** d. Nấm sợi
2. Vi khuẩn axêtic là tác nhân của quá trình nào sau đây ?
 - a. Biến đổi axit axêtic thành glucôzơ
 - b. Chuyển hóa rượu thành axit axêtic**
 - c. Chuyển hóa glucôzơ thành rượu
 - d. Chuyển hóa glucôzơ thành axit axêtic
3. Quá trình biến đổi rượu thành đường glucôzơ được thực hiện bởi
 - a. Nấm men** c. Vi khuẩn
 - b. Nấm sợi d. Vi tảo
4. Cho sơ đồ tóm tắt sau đây :

(A) axit lactic
 (A) là :

 - a. Glucôzơ** c. Tinh bột
 - b. Prôtêin d. Xenlulôzơ
5. Sản phẩm nào sau đây được tạo ra từ quá trình lên men lactic?
 - a. Axit glutamic c. Pôlisaccharit
 - b. Sữa chua** d. Disaccharit
6. Trong gia đình, có thể ứng dụng hoạt động của vi khuẩn lactic để thực hiện quá trình nào sau đây ?
 - a. Làm tương c. Muối dưa
 - b. Làm nước mắm d. Làm giấm
7. Cho sơ đồ phản ứng sau đây :

Rượu êtanol + O₂ (X) + H₂O + năng lượng

(X) là :

 - a. Axit lactic c. Dưa chua
 - b. Sữa chua d. Axit axêtic
8. Cũng theo dữ kiện của câu 7 nêu trên ; quá trình của phản ứng được gọi là :
 - a. Sự lên men c. Ôxi hoá
 - b. Sự đồng hóa d. Đường phân
9. Quá trình nào sau đây không phải là ứng dụng lên men
 - a. Muối dưa , cà c . Tạo rượu
 - b. Làm sữa chua d. **Làm dấm**
10. Loại vi khuẩn sau đây hoạt động trong điều kiện hiếu khí là :
 - a. Vi khuẩn lactic c. **Vi khuẩn axêtic**
 - b. Nấm men d. Cả a,b,c đều đúng

Chương 2

Sinh tr-ëng vµ ph,t triÓn ë vi sinh vËt

Bµi sinh tr-ëng cñã vi sinh vËt

1. Sự sinh trưởng của vi sinh vật được hiểu là :
 - a. Sự tăng các thành phần của tế bào vi sinh vật
 - b. Sự tăng kích thước và số lượng của vi sinh vật
 - c. Cả a,b đúng**

- d. Cả a,b,c đều sai
3. Thời gian cần thiết để một tế bào vi sinh vật phân chia được gọi là
- Thời gian một thế hệ
 - Thời gian sinh trưởng
 - Thời gian sinh trưởng và phát triển
 - Thời gian tiềm phát
- bỏ câu 3,4,5
4. Có một tế bào vi sinh vật có thời gian của một thế hệ là 30 phút . Số tế bào tạo ra từ tế bào nói trên sau 3 giờ là bao nhiêu ?
- a. 64 b.32 c.16 d.8
5. Trong thời gian 100 phút , từ một tế bào vi khuẩn đã phân bào tạo ra tất cả 32 tế bào mới . Hãy cho biết thời gian cần thiết cho một thế hệ của tế bào trên là bao nhiêu ?
- a. 2 giờ b. 60 phút c. 40 phút d. 20 phút
- Bỏ câu 8 và 9
- 10 . Số tế bào tạo ra từ 8 vi khuẩn E. Coli đều phân bào 4 lần là :
- a. 100 b.110 c.128 d.148
11. Trong môi trường cây không được bổ sung chất dinh dưỡng thì quá trình sinh trưởng của vi sinh vật biểu hiện mấy pha ?
- a. 3 b.4 c.5 d.6
12. Thời gian tính từ lúc vi khuẩn được nuôi cây đến khi chúng bắt đầu sinh trưởng được gọi là :
- Pha tiềm phát
 - Pha cân bằng động
 - Pha luỹ thừa
 - Pha suy vong
11. Biểu hiện của vi sinh vật ở pha tiềm phát là :
- Vi sinh vật trưởng mạnh
 - Vi sinh vật trưởng yếu
 - Vi sinh vật bắt đầu sinh trưởng
 - Vi sinh vật thích nghi dần với môi trường nuôi cây
14. Hoạt động nào sau đây xảy ra ở vi sinh vật trong pha phát ?
- Tế bào phân chia
 - Có sự hình thành và tích luỹ các enzym
 - Lượng tế bào tăng mạnh mẽ
 - Lượng tế bào tăng ít
15. Trong môi trường nuôi cây , vi sinh có quá trình trao đổi chất mạnh mẽ nhất ở :
- Pha tiềm phát
 - Pha cân bằng động
 - Pha luỹ thừa
 - Pha suy vong
16. Biểu hiện sinh trưởng của vi sinh vật ở pha cân bằng động là :
- Số được sinh ra nhiều hơn số chết đi
 - Số chết đi nhiều hơn số được sinh ra
 - Số được sinh ra bằng với số chết đi
 - Chỉ có chết mà không có sinh ra.
17. Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến ở giai đoạn sau của quá trình nuôi cây, vi sinh vật giảm dần đến số lượng là :

- a. Chất dinh dưỡng ngày càng cạn kiệt
 b. Các chất độc xuất hiện ngày càng nhiều

c. Cả a và b đúng

- d. Do một nguyên nhân khác

18. Pha log là tên gọi khác của giai đoạn nào sau đây ?

- a. Pha tiềm phát c. Pha cân bằng

b. Pha luỹ thừa d. Pha suy vong

19. Biểu hiện sinh trưởng của vi sinh vật ở pha suy vong là :

- a. Số lượng sinh ra cân bằng với số lượng chết đi

b Số chết đi ít hơn số được sinh ra

c. Số lượng sinh ra ít hơn số lượng chết đi

d. Không có chết, chỉ có sinh.

20. Vì sao trong môi trường nuôi cây liên tục pha luỹ thừa luôn kéo dài?

- a. Có sự bổ sung chất dinh dưỡng mới

b. Loại bỏ những chất độc, thải ra khỏi môi trường

c. Cả a và b đúng

d. Tất cả a, b, c đều sai

BÀI SỰ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

1. Vi khuẩn sinh sản chủ yếu bằng cách :

a. Phân đôi c. Tiếp hợp

b. Nẩy chồi d. Hữu tính

2. Hình thức sinh sản của xạ khuẩn là :

a. Bằng bào tử hữu tính

b. Bằng bào tử vô tính

c. Đứt đoạn

d. Tiếp hợp

3. Phát biểu sau đây đúng khi nói về sự sinh sản của vi khuẩn là :

a. Có sự hình thành thoi phân bào

b. Chủ yếu bằng hình thức giảm phân

c. Phổ biến theo lối nguyên phân

d. Không có sự hình thành thoi phân bào

4. Trong các hình thức sinh sản sau đây thì hình thức sinh sản đơn giản nhất là :

a. Nguyên phân **c. Phân đôi**

b. Giảm phân d. Nẩy chồi

5. Sinh sản theo lối nẩy chồi xảy ra ở vi sinh vật nào sau đây ?

a. Nấm men c. Trực khuẩn

b. Xạ khuẩn d. Tảo lục

6. Hình thức sinh sản có thể tìm thấy ở nấm men là :

a. Tiếp hợp và bằng bào tử vô tính

b. Phân đôi và nẩy chồi

c. Tiếp hợp và bằng bào tử hữu tính

d. Bằng tiếp hợp và phân đôi

7. Vi sinh vật nào sau đây có thể sinh sản bằng bào tử vô tính và bào tử hữu tính ?

- a. Vi khuẩn hình que
 - b. Vi khuẩn hình cầu
 - c. Nấm mốc**
 - d. Vi khuẩn hình sợi
8. Ở nấm rơm, bào tử sinh sản được chứa ở :
- a. Trên sợi nấm
 - b. Mặt dưới của mũ nấm**
 - c. Mặt trên của mũ
 - d. Phía dưới sợi nấm
9. Vì sinh vật nào sau đây không sinh sản bằng bào tử
- a. Nấm mốc
 - b. Xạ khuẩn
 - c. Nấm rơm
 - d. Đa số vi khuẩn**

BÀI TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ HÓA HỌC LÊN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

1. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về các nguyên tố : C,H,O
 - a. Là những nguyên tố vi lượng
 - b. Cần cho cơ thể sinh vật với một lượng rất ít
 - c. Có trong thành phần của cacbonhidrat, lipit, prôtêin và axitnuclêic**
 - d. Cả a, b, c đều đúng
2. Nhóm nguyên tố nào sau đây không phải là nguyên tố đại lượng ?
 - a. C,H,O c. P,C,H,O
 - b. H,O,N **d. Zn,Mn,Mo**
3. Các nguyên tố cần cho hoạt hóa các enzym là :
 - a. Các nguyên tố vi lượng (Zn,Mn,Mo...)**
 - b. C,H,O
 - c. C,H,O,N
 - d. Các nguyên tố đại lượng
4. Hoá chất nào sau đây có tác dụng ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật ?
 - a. Prôtêin c. Pôlisaccharit
 - b. Mônôsaccharit d. Phênhol**
5. Chất sau đây có nguồn gốc từ hoạt động của vi sinh vật và có tác dụng ức chế hoạt động của vi sinh vật khác là :
 - a. Chất kháng sinh**
 - b. Aldêhit
 - c. Các hợp chất cacbonhidrat
 - d. Axit amin
6. Chất nào sau đây có tác dụng diệt khuẩn có tính chọn lọc ?
 - a. Các chất phênhol
 - b. Chất kháng sinh**
 - c. Phoocmalđêhit
 - d. Rượu

7. Vai trò của phốtpho đối với tế bào là :
- Cần cho sự tổng hợp axit nuclêic(ADN,ARN)
 - Là thành phần của màng tế bào
 - Tham gia tổng hợp ATP
 - Cả a,b,c đều đúng**
8. Chất kháng sinh có nguồn gốc chủ yếu từ dạng vi sinh vật nào sau đây?
- Vi khuẩn hình que
 - Vi rut
 - Xạ khuẩn**
 - Nấm mốc
9. Phát biểu sau đây có nội dung đúng là :
- Các nguyên tố đại lượng cần cho cơ thể với một lượng rất nhỏ
 - Cábon là nguyên tố vi lượng
 - Kẽm là nguyên tố đại lượng
 - Hidrô là nguyên tố đại lượng**
10. Ngoài xạ khuẩn dạng vi sinh vật nào sau đây có thể tạo ra chất kháng sinh ?
- Nấm**
 - Tảo đơn bào
 - Vi khuẩn chứa diệp lục
 - Vi khuẩn lưu huỳnh

BÀI ÁNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ VẬT LÝ LÊN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT

1. Dựa trên nhiệt độ tối ưu của sự sinh trưởng mà vi sinh vật được chia làm các nhóm nào sau đây ?
- Nhóm ưa nhiệt và nhóm kị nhiệt
 - Nhóm ưa lạnh , nhóm ưa ấm và nhóm ưa nhiệt**
 - Nhóm ưa lạnh, nhóm ưa nóng
 - Nhóm ưa nóng, nhóm ưa ấm
2. Khoảng nhiệt độ thích hợp cho sự sinh trưởng của các vi sinh vật thuộc nhóm ưa ấm là :
- 5-10 độ C
 - 10-20 độ C
 - c. 20-40 độ C**
 - 40-50 độ C
- 3.Có một dạng vi sinh vật sinh trưởng rất mạnh ở nhiệt độ môi trường dưới 10 độ C. Dạng vi sinh vật đó thuộc nhóm nào sau đây ?
- Nhóm ưa lạnh,**
 - Nhóm ưa nóng
 - Nhóm ưa ấm
 - Nhóm ưa nhiệt
4. Mức nhiệt độ tối ưu cho sinh trưởng vi sinh vật là mức nhiệt độ mà ở đó :
- Vi sinh vật bắt đầu sinh trưởng
 - Vi sinh vật bắt đầu giảm sinh trưởng
 - Vi sinh vật dừng sinh trưởng
 - Vi sinh vật sinh trưởng mạnh nhất**
5. Vi sinh vật nào sau đây thuộc nhóm ưa ấm ?
- Vi sinh vật đất
 - Vi sinh vật sống trong cơ thể người
 - Vi sinh vật sống trong cơ thể gia súc , gia cầm

d. Cả a, b, c đều đúng

6. Phần lớn vi sinh vật sống trong nước thuộc nhóm vi sinh vật nào sau đây ?

a. Nhóm ưa lạnh

b. Nhóm ưa ấm

c. Nhóm kị nóng

d. Nhóm chịu nhiệt

7. Đặc điểm của vi sinh vật ưa nóng là :

a. Rất dễ chết khi môi trường gia tăng nhiệt độ

b. Các enzym của chúng dễ mất hoạt tính khi gặp nhiệt độ cao

c. Prôtêin của chúng được tổng hợp mạnh ở nhiệt độ ấm

d. Enzym và prôtêin của chúng thích ứng với nhiệt độ cao

Bỏ câu 8,9,10

11. Dựa trên tác dụng của độ pH lên sự sinh trưởng của vi sinh vật , người ta chia vi sinh vật làm các nhóm là :

a. Nhóm ưa kiềm và nhóm axit

b. Nhóm ưa axit và nhóm ưa trung tính

c. Nhóm ưa kiềm nhóm ưa axit và nhóm ưa trung tính

d. Nhóm ưa trung tính và nhóm ưa kiềm

12. Đa số vi khuẩn sống ký sinh được xếp vào nhóm :

a. Ưa kiềm c. Ưa axit

b. Ưa trung tính d. Ưa kiềm và a xít

13. Vi sinh vật nào sau đây là nhóm ưa axit?

a. Đa số vi khuẩn c. Động vật nguyên sinh

b. Xạ khuẩn **d. Nấm men , nấm mốc**

14. Vi sinh vật sau đây trong hoạt động sống tiết ra axit làm giảm độ PH của môi trường là :

a. Xạ khuẩn c. Vi khuẩn lam

b. Vi khuẩn lactic d. Vi khuẩn lưu huỳnh

15. Môi trường nào sau đây có chứa ít vi khuẩn ký sinh gây bệnh hơn các môi trường còn lại ?

a. Trong đất ẩm c. Trong máu động vật

b. Trong sữa chua d. Trong không khí

16.Nhóm vi sinh vật sau đây có nhu cầu độ ẩm cao trong môi trường sống so với các nhóm vi sinh vật còn lại là :

a. Vi khuẩn c. Nấm men

b. Xạ khuẩn d. Nấm mốc

CHƯƠNG III: KHÁI NIỆM VỀ VIRUT BÀI CÁC LOẠI VIRUT

1. Điều sau đây đúng khi nói về vi rút là :

a. Là dạng sống đơn giản nhất

b. Dạng sống không có cấu tạo tế bào

c. Chỉ cấu tạo từ hai thành phần cơ bản prôtêin và axit nuclêic

d. Cả a, b, c đều đúng

2. Hình thức sống của vi rut là :

- a. Sống kí sinh không bắt buộc
- b. Sống hoại sinh
- c. Sống cộng sinh

d. Sống kí sinh bắt buộc

3. Đặc điểm sinh sản của vi rut là:

- a. Sinh sản bằng cách nhân đôi
- b. Sinh sản dựa vào nguyên liệu của tế bào chủ**
- c. Sinh sản hữu tính
- d. Sinh sản tiếp hợp

Bỏ 4,5,6

5(B) là :

- a. Hoại sinh
- b. Cộng sinh
- c. Kí sinh bắt buộc**
- d. Kí sinh không bắt buộc

6(C) là :

- a. Các nhiễm sắc thể
- b. ADN và ARN
- c. ADN hoặc ARN**
- d. Prôtêin

7. Đơn vị đo kích thước của vi khuẩn là :

a. Nanômet(nm) c. Milimet(nm)

b. Micrômet(nm) d. Cả 3 đơn vị trên

6. Cấu tạo nào sau đây đúng với vi rut?

- a. Tế bào có màng, tế bào chất, chưa có nhân
- b. Tế bào có màng, tế bào chất, có nhân sơ
- c. Tế bào có màng, tế bào chất, có nhân chuẩn
- d. Có các vỏ capxit chứa bộ gen bên trong**

9. Vỏ capxit của vi rút được cấu tạo bằng chất :

a. Axit đê ô xiriboonucleic

b. Axit ribônuclêic

c. Prôtêin

d. Disaccarit

10. Nucléôcaxit là tên gọi dùng để chỉ :

a. Phức hợp gồm vỏ capxit và axit nucleic

b. Các vỏ capxit của vi rút

c. Bộ gen chứa ADN của vi rút

d. Bộ gen chứa ARN của vi rút

11. Vi rút trần là vi rút

a. Có nhiều lớp vỏ prôtêin bao bọc

b. Chỉ có lớp vỏ ngoài, không có lớp vỏ trong

c. Có cả lớp vỏ trong và lớp vỏ ngoài

d. Không có lớp vỏ ngoài

12. Trên lớp vỏ ngoài của vi rút có yếu tố nào sau đây ?

a. Bộ gen

b. **Kháng nguyên**

c. Phân tử ADN

d. Phân tử ARN

13. Lần đầu tiên , vi rút được phát hiện trên

a. Cây dâu tây

b. Cây cà chua

c. **Cây thuốc lá**

d. Cây đậu Hà Lan

14. Dựa vào hình thái ngoài , virut được phân chia thành các dạng nào sau đây?

a. Dạng que, dạng xoắn

b. Dạng cầu, dạng khối đa diện, dạng que

c. Dạng xoắn , dạng khối đa diện , dạng que

d. Dạng xoắn , dạng khối đa diện, dạng phối hợp

15. Virut nào sau đây có dạng khối ?

a. Virut gây bệnh khâm ở cây thuốc lá

b. Virut gây bệnh đại

c. Virut gây bệnh bại liệt

d. Thể thực khuẩn

16. Phago là dạng virut sống ký sinh ở :

a. Động vật c. Người

b. Thực vật **d. Vi sinh vật**

17. Thể thực khuẩn là vi rut có cấu trúc

a. Dạng xoắn c. Dạng khối

b. Dạng phối hợp d. Dạng que

18. Vi rut nào sau đây vừa có dạng cấu trúc khối vừa có dạng cấu trúc xoắn?

a. Thể thực khuẩn c. Virut gây cúm

b. Virut HIV d. Virut gây bệnh đại

bỏ 19-21

22. Virut chỉ chứa ADN mà không chứa ARN là :

a. Virut gây bệnh khâm thuốc lá

b. Virut HIV

c. Virut gây bệnh cúm ở gia cầm

d. Cả 3 dạng Virut trên

23. Virut chỉ chứa ADN mà không chứa ARN là :

a. Virut gây bệnh khâm ở cây dưa chuột

b. Virut gây bệnh vàng cây lúa mạch

c. Virut cúm gia cầm

d. Cả a,b,c đều sai

24. Câu có nội dung đúng trong các câu sau đây là :

a. Virut gây bệnh ở người có chứa ADN và ARN

b. Virut gây bệnh ở thực vật thường bộ gen chỉ có ARN

c. Thể thực khuẩn không có bộ gen

d. Virut gây bệnh ở vật nuôi không có vỏ capsid

Bài : Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

1. Quá trình nhân lên của Virut trong tế bào chủ bao gồm mấy giai đoạn
a.3 b.4 **c.5** d.6
2. Giai đoạn nào sau đây xảy ra sự liên kết giữa các thụ thể của . Virut với thụ thể của tế bào chủ ?
a. Giai đoạn xâm nhập
b. Giai đoạn sinh tổng hợp
c. Giai đoạn hấp phụ
d. Giai đoạn phóng thích
3. Ở giai đoạn xâm nhập của Virut vào tế bào chủ xảy ra hiện tượng nào sau đây ?
a. Virut bám trên bề mặt của tế bào chủ
b. axit nucléic của Virut được đưa vào tế bào chất của tế bào chủ
c. Thụ thể của Virut liên kết với thụ thể của tế bào chủ
d. Virut di chuyển vào nhân của tế bào chủ
4. Virut sử dụng enzym và nguyên liệu của tế bào chủ để tổng hợp axit nucléic và prôtêin. Hoạt động này xảy ra ở giai đoạn nào sau đây ?
a. Giai đoạn hấp phụ
b. Giai đoạn xâm nhập
c. Giai đoạn tổng hợp
d. Giai đoạn phóng thích
5. Hoạt động xảy ra ở giai đoạn lắp ráp của quá trình xâm nhập vào tế bào chủ của virut là
a. Lắp axit nucléic vào prôtêin để tạo virut
b. Tổng hợp axit nucléic cho virut
c. Tổng hợp prôtêin cho virut
d. Giải phóng bộ gen của virut vào tế bào chủ
6. Virut được tạo ra rời tế bào chủ ở giai đoạn nào sau đây ?
a. Giai đoạn tổng hợp
b. Giai đoạn phóng thích
c. Giai đoạn lắp ráp
d. Giai đoạn xâm nhập
7. Sinh tan là quá trình :
a. Virut xâm nhập vào tế bào chủ
b. Virut sinh sản trong tế bào chủ
c. Virut nhân lên và làm tan tế bào chủ
d. Virut gắn trên bề mặt của tế bào chủ
8. Hiện tượng Virut xâm nhập và gắn bộ gen vào tế bào chủ mà tế bào chủ vẫn sinh trưởng bình thường được gọi là hiện tượng :
a. Tiềm tan c. Hoà tan
b. Sinh tan d. Tan rã
9. Virut nào sau đây gây hội chứng suy giảm miễn dịch ở người?
a. Thể thực khuẩn c.H5N1
b. HIV d. Virut của E.coli
10. Tế bào nào sau đây bị phá huỷ khi HIV xâm nhập vào cơ thể chủ

a. Tế bào limphôT

b. Đại thực bào

c. Các tế bào của hệ miễn dịch

d. **Cả a,b,c đều đúng**

11. Các vi sinh vật lợi dụng lúc cơ thể suy giảm miễn dịch để tấn công gây các bệnh khác, được gọi là :

a. Vi sinh vật cộng sinh

b. Vi sinh vật hoại sinh

c. **Vi sinh vật cơ hội**

d. Vi sinh vật tiềm tan

12. Hoạt động nào sau đây không lây truyền HIV?

a. Sử dụng chung dụng cụ tiêm chích với người nhiễm HIV

b. **Bắt tay qua giao tiếp**

c. Truyền máu đã bị nhiễm HIV

d. Tất cả các hoạt động trên

13. Con đường nào có thể lây truyền HIV?

a. Đường máu

b. Đường tình dục

c. Qua mang thai hay qua sữa mẹ nếu mẹ nhiễm HIV

d. **Cả a,b,c đều đúng**

14. Quá trình phát triển của bệnh AIDS có mấy giai đoạn ?

a.5 b.4 c.3 d.2

15. Biểu hiện ở người bệnh vào giai đoạn đầu của nhiễm HIV là :

a. Xuất hiện các bệnh nhiễm trùng cơ hội

b. Không có triệu chứng rõ rệt

c. Trí nhớ bị giảm sút

d. **Xuất hiện các rối loạn tim mạch**

16. Các bệnh cơ hội xuất hiện ở người bị nhiễm HIV vào giai đoạn nào sau đây ?

a. Giai đoạn sơ nhiễm không triệu chứng

b. Giai đoạn có triệu chứng nhưng không rõ nguyên nhân

c. **Giai đoạn thứ ba**

d. Tất cả các giai đoạn trên .

17. Thông thường thời gian xuất hiện triệu chứng điển hình của bệnh AIDS tính từ lúc bắt đầu nhiễm HIV là :

a. **10 năm** c. 5 năm

b. 6 năm d. 3 năm

19. Biện pháp nào sau đây góp phần phòng tránh việc lây truyền HIV/AIDS?

a. Thực hiện đúng các biện pháp vệ sinh y tế

b. Không tiêm chích ma tuý

c. Có lối sống lành mạnh

d. **Tất cả các biện pháp trên**

Bài : Virut gây bệnh cho vi sinh vật , thực vật , côn trùng - ứng dụng của virut trong thực tiễn

1. Có bao nhiêu loại thể thực khuẩn đã được xác định ?
 - a. Khoảng 3000
 - b. Khoảng 2500
 - c. Khoảng 1500 đến 2000
 - d. Khoảng 1000
2. Thể thực khuẩn có thể sống kí sinh ở :
 - a. Vi khuẩn
 - b. Xạ khuẩn
 - c. Nấm men, nấm sợi
 - d. Cả a, b, c đều đúng**
3. Ngành công nghệ vi sinh nào sau đây có thể bị thiệt hại do hoạt động kí sinh của thể thực khuẩn ?
 - a. Sản xuất thuốc trừ sâu sinh học
 - b. Sản xuất thuốc kháng sinh
 - c. Sản xuất mì chính
 - d. Cả a,b,c đều đúng**
4. Virut xâm nhập từ ngoài vào tế bào thực vật bằng cách nào sau đây ?
 - a. Tự Virut chui qua thành xenlulôzơ vào tế bào
 - b. Qua các vết chích của côn trùng hay qua các vết xước trên cây**
 - c. Cả a và b đều đúng
 - d. Cả a, b, c đều sai
5. Virut di chuyển từ tế bào này sang tế bào khác của cây nhờ vào :
 - a. Sự di chuyển của các bào quan
 - b. Quá các chất bài tiết từ bộ máy gôn gi
 - c. Các cầu sinh chất nối giữa các tế bào**
 - d. Hoạt động của nhân tế bào
6. Trong các bệnh được liệt kê sau đây, bệnh do virut gây ra là :
 - a. Viêm não Nhật bản** c. Uốn ván
 - b. Thương hàn d. Dịch hạch
7. Bệnh nào sau đây không phải do Virut gây ra ?
 - a. Đại liệt c. Viêm gan B
 - b. Lang ben** d. Quai bị
7. Trong kỹ thuật cây gen, phago được sử dụng để :
 - a. Cắt một đoạn gen của ADN tế bào nhận
 - b. Nối một đoạn gen vào ADN của tế bào cho
 - c. Làm vật trung gian chuyển gen từ tế bào cho sang tế bào nhận**
 - d. Tách phân tử ADN khỏi tế bào cho
9. Loại Virut nào sau đây được dùng làm thẻ truyền gen trong kỹ thuật cây gen ?
 - a. Thể thực khuẩn**
 - b. Virut kí sinh trên động vật
 - c. Virut kí sinh trên thực vật
 - d. Virut kí sinh trên người

1. Sinh vật nào sau đây là vật trung gian làm lan truyền bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất .
 - a. Virut
 - b. Vi khuẩn
 - c. Động vật nguyên sinh
 - d. Côn trùng**
2. Bệnh truyền nhiễm bệnh :
 - a. Lây lan từ cá thể này sang cá thể khác
 - b. Do vi khuẩn và Virut gây ra
 - c. Do vi nấm và động vật nguyên sinh gây ra
 - d. Cả a, b, c đều đúng**
3. Bệnh truyền nhiễm sau đây không lây truyền qua đường hô hấp là
 - a. Bệnh SARS **c. Bệnh AIDS**
 - b. Bệnh lao d. Bệnh cúm
4. Bệnh truyền nhiễm sau đây lây truyền qua đường tình dục là :
 - a. Bệnh giang mai
 - b. Bệnh lậu
 - c. Bệnh viêm gan B
 - d. Cả a,b,c đều đúng**
5. Khả năng của cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh được gọi là :
 - a. Kháng thể **c. Miễn dịch**
 - b. Kháng nguyên d. Đề kháng
6. Điều đúng khi nói về miễn dịch không đặc hiệu là :
 - a. Là loại miễn dịch tự nhiên mang tính bẩm sinh**
 - b. Xuất hiện sau khi bệnh và tự khỏi
 - c. Xuất hiện sau khi được tiêm vaccine vào cơ thể .
 - d. Cả a, b,c đều đúng
7. Yếu tố nào sau đây không phải của miễn dịch không đặc hiệu ?
 - a. Các yếu tố đề kháng tự nhiên của da và niêm mạc .
 - b. Các dịch tiết của cơ thể như nước bọt , nước mắt , dịch vị .
 - c. Huyết thanh chứa kháng thể tiêm điều trị bệnh cho cơ thể .**
 - d. Các đại thực bào , bạch cầu trung tính của cơ thể .
8. Người ta phân chia miễn dịch đặc hiệu làm mấy loại ?
 - a.2 b.3 c.4 d.5**
8. Nhóm miễn dịch sau đây thuộc loại miễn dịch đặc hiệu là :
 - a. Miễn dịch tế bào và miễn dịch không đặc hiệu
 - b. Miễn dịch thể dịch và miễn dịch tế bào**
 - c. Miễn dịch tự nhiên và miễn dịch thể dịch
 - d. Miễn dịch tế bào và miễn dịch bẩm sinh
10. Hoạt động sau đây thuộc loại miễn dịch thể dịch là :
 - a. Thực bào
 - b. Sản xuất ra bạch cầu
 - c. Sản xuất ra kháng thể**
 - d. Tất cả các hoạt động trên .
11. Chất nào sau đây là kháng nguyên khi xâm nhập vào cơ thể ?

- a. Độc tố của vi khuẩn
- b. Nọc rắn
- c. Prôtêin của nấm độc
- d. Cả a,b,c đều đúng

12. Một chất (A) có bản chất prôtêin khi xâm nhập vào cơ thể khác sẽ kích cơ thể tạo ra chất gây phản ứng đặc hiệu với nó. Chất (A) được gọi là

- a. Kháng thể c. Chất cảm ứng
- b. Kháng nguyên d. Chất kích thích

13. Chất gây phản ứng đặc hiệu với kháng nguyên được gọi là :

- a. Độc tố c. Kháng thể
- b. Chất cảm ứng d. Hoocmon

14. Loại miễn dịch nào sau đây có sự tham gia của các tế bào lymphô T độc ?

- a. Miễn dịch tự nhiên c. Miễn dịch thể dịch
- b. Miễn dịch bẩm sinh d. Miễn dịch tế bào